





ПОВЕЗ
Сте. Вуксановић
БЕОГРАД

P19Cp II 475.1

P11313




РД 313

РД СР II 475.1

ОСНОВНЕ ЧЕРТЕ

РАВНЕ И СФЕРИЧНЕ

ТРИГОНОМЕТРИЈЕ.



ЗА ПОТРЕБУ ВИШИ УЧИЛИШТА КНЯЖ.
СРБИЈЕ

ИЗРАДИО

ВУШТАНИЈЕВЪ РОСИМОВИЧЪ,

при военой академіи К. С. основне и више математике, практичне геометріи и механике професоръ; школске комисіи и друштва србске словесности чланъ.

прегледала и одобрила школска комисія.

цена е 12 гроша.

У БЕОГРАДУ.

У Книгопечатњи Княжества Србів.

1854.

Нвв. 6р. 198719



Wirke! Das ist das große Gesetz, in des Tempels
Tafeln gehauen. Klopstock.

ПРЕДГОВОРЪ.

Три важна узрока, 1.) безъ сумнѣ велика педагогична и практична користь математичнога знаня, — 2.) врло ограничено башъ таково знанѣ кодъ веће части наши учителя, особито по маньимъ школама, и 3.) готово коначна оскудица у цели сходнымъ те струке делама на нашемъ єзику: побудила су ме на израђенѣ математике за школску потребу, одъ првогъ корака у ньой па до найвыше кодъ насъ учеће се нѣне части, найсходніимъ, постепеномъ умномъ развіянью ученика саображаваюћимъ се начиномъ и обзиромъ на горе поменуту нѣну двояку цѣль.

Тимъ се я посломъ занимамъ већъ више година; но како ми зато збогъ многи други мои явны и приватны дужностій врло мало времена остає, то ће проћи безъ сумнѣ іошъ неколико година докъ съ нымъ сасвимъ и онако готовъ будемъ као што самъ радъ.

Тога ради, т. є. да бы и дотле нешто принео къ олакшици и што већемъ успеху учеће се наше младежи у той науци, предузео самъ израђивати према потреби,

но сасвимъ у кратко све оне нѣне части, коє се кодъ насъ дояко іошъ никако нису учили и о коима іошъ манѣ на нашемъ єзи-зу каковы кнѣига има.

Томъ намеромъ дакле и тимъ начиномъ израѣене су ове, одъ высокославногъ попечительства просвєштєня за школску кнѣигу примлѣне „**основне черте равне и сферичне тригонометріє.**“

Све ово морао самъ напоменути, да ме небы ко окривіо збогъ того, што се появлюємъ найпре съ онаковымъ частима мого предмета, коє друге простіє предпоставляю, и при томъ зашто у таковой само краткоѣи.

У осталомъ еда ли и у колико ово мое делце одговара изьявлѣной намери съ нѣимъ и потреби наши выши школа, за коє є написано, — као и є ли распореѣєнѣ и излаганѣ нѣговы предмета педагогично и практично сходно: нека пресуде они, кои све то, па дакле и исту науку познаю болѣ него я. Критика у томъ обзиру и одъ таковы лица бытѣе ми тимъ милія, што бы се нѣомъ осимъ мана, коє на свакій начинѣ исправити валя, відкрило уєдно и све оно, што є оригинално, и коє ми се дакле у праву аукторску заслугу брояти има.

При томъ имамъ само іошъ приметити како самъ я при израѣєню истогъ овогъ

делца осимъ већъ познате цели имао јошъ поглавито у виду и практичну потребу оны мои ученика, кои ће остати и после у техничној струци.

Та в њјова потреба мени као инжењеру и уобште технику, смемъ рећи, врло добро позната. Поуздано надамъ се дакле, да самъ съ њимъ намирјо ако мож' да не и ону другу, а оно баръ ову јдну потребу, и да зато заслужуемъ ако иначе ничію, а оно за цело тјј мои ученика признателность. Увиде ли они то поздніе, онда е мой трудъ више него у пола награђенъ.

Напослѣдку у смотрењу јзика признаемъ искрено, да самъ јошъ доста слабъ, но и сасвимъ наравно, јръ е была такова прилика, да самъ и я као многи други Срби осимъ часловца и псалтира све друго морао учити на туђемъ јзику. Погрешке дакле у томъ смотрењу опраштайте да бы вамъ се опростиле.

На Иванъданъ 1854.

Јосимовићъ.

САДРЖАЙ.

	Страна
Уводъ	1.

Књига прва. Гоніометрія.

А.) Просте или основне гоніометричне функціе.

I. Основна понятія	3.
II. Свойства основны функція	5.
прегледна таблица овы свойства	9.
таблица комплементарны и суплементарны функція	12.
III. Меѣусобно одношенѣ функція	13.
прегледна таблица овы одношеня	17.

Б.) Сложене функціе.

I. Функціе сбора и разлике два угла	18.
II. Сборъ и разлика едноимены функція два угла	22.
III. Функціе двогубогъ угла и полуугла	24.

В.) Преобраћанѣ функція и нѣово рачунанѣ.

I. Преобраћанѣ ф.	29.
II. Рачунанѣ ф. за полупречникъ 1.	32.

Г.) Построй и употреблѣнѣ тригон. таблица, и преобраћанѣ лучне мере у праву и обратно.

I. Построй и употреблѣнѣ тригон. таблица	44.
II. Преобраћанѣ лучне мере у праву и обратно	51.

Књига друга. Равна Тригонометрія.

А.) Разрешенѣ триуглова.

I. Обшта свойства триуглова	54.
---------------------------------------	-----

II. Разрешенъ правоуглогъ триугла	
а.) у обичнымъ случаевима	59.
таблица образаца за разр. правоуг. тр.	
у свима овимъ случаевима	63.
б.) у некимъ особитымъ случаевима	64.

III. Разрешенъ косоуглогъ триугла	
а.) у найобичніимъ случаевима	69.
б.) у некимъ особитымъ случаевима	80.

**Б.) Употребленіе доakoшнѣга на разрешеніе неко-
лико геометр. задатака.**

I. Разрешеніе неколико задатака о кругу	84.
II. Опредѣляваніе непрístupны одстоянія	89.
III. " висина	93.
IV. Потентовъ проблемъ	95.
V. Среднѣнъ угла	99.

Кнѣига треѣа. Сферична Тригонометрія.

**A.) Уводна понятія и правила; свойства сферичны триу-
глова, и основна уравненія сфер. тригонометріе.**

I. Уводна понятія и правила	101.
II. Свойства сферичны триуглова	108.
III. Основна уравненія за разрешеніе сф. триуглова	117.

Б.) Разрешеніе сфер. триуглова.

I. Разрешеніе правоуглогъ триугла	125.
II. Разрешеніе косоуглогъ триугла	134.
III. Опредѣляваніе садржая и ексцеса сфер. триуглова	147.

В.) Разрешеніе два важна геодетична задатка.

I. Пренананіе угла на хоризонтъ	159.
II. " сфер. угла на тетивке	163.

Особитый додатокъ.

Назначеніе неколико обширніи тригоном. дела	165
---	-----

У В О Д Ъ.

§. 1.

Изъ геометріе знамо, да е свакій триугалъ са три нѣгова основка — стране и угли —, међу коима е найманъ една страна, подпуно определѣнь.

Часть математике, коя учи изъ три у броевима задата основка триугла остале нѣгове основке и садржай рачуномъ определити, или краће рећи: триугалъ разрешити, зове се тригонометрія или тригломеріе.

Ова наука дели се по положеню вопроснога триугла на равну и сферичну тригонометрію. Равна тригонометрія занима се съ триуглима у равнини, а сферична съ триуглима на поврщію сфере.

§. 2.

Тригонометрія по горнѣму основана е на строгой међусобной зависимости угла и страна триугла. Но одношенъ исты нѣговы основака, збогъ нѣгове разнородности, неможе се определити непосредствено само броемъ; зато тригонометрія, да бы свою цѣль постигла, мора узети у помоћъ неке одъ угла зависне, а странама сразмерне праве, кое називамо тригонометричнымъ, или болъ гониометричнымъ — угломернымъ — пругама.



Нѣнъ задатакъ састои се дакле найпре у испытываню свойства гоніометричны пруга и нѣювомъ разномъ определяваню, а потомъ у употребленю исты пруга на разрешенѣ правостраны и сферичны триуглова. Тога ради делимо целу науку на три главне части или кнѣиге. Прва сматра гоніометричне пруге, збогъ чега називамо ю гоніометріомъ; оне друге две пакъ употребляю докученя прве на разрешенѣ правостраны и сферичны триуглова, и образую дакле равну и сферичну тригонометрію у тешнѣмъ или правомъ смислу.

Гоніометрично разрешенѣ полигона сачинява за себе четврту часть тригонометріе подъ именовъ полигонометріа, коя се у новіе доба подигла до особите науке, но о коіой у овоме дѣлу, као о предмету изванъ нѣговы граница лежеѣмъ, неможе быти никаковогъ далѣгъ спомена.

§. 3.

Што се наипосле тиче начина у тригонометричнымъ доводима и доказима, то се ови могу извести или геометричнымъ или чѣсто аналитичнымъ сматранѣмъ. Последнѣй се начинъ у наше доба, збогъ савршене общности таковы доказа, вѣhma употребляе; но мы ѣемо се при свемъ томъ и онымъ првымъ служити свуда, гди се съ нѣимъ брже и лакше до цѣли долази.

КНЬИГА ПРВА.

Г О Н І О М Е Т Р І Я.

А.) Просте или основне функціе.

I. Основна понятія.

§. 4.

Ако изъ врха C некогъ угла $ACM = \varphi$ (сли- сл. 1. ка 1.) напишемо међу нѣгове краке съ произвольнымъ полупречникомъ $AC = CM = r$ лукъ AM , и спустимо потомъ изъ єдногъ края M истога лука на супротный полупречникъ AC управну MD , у другомъ пакъ лука краю A подигнемо на истый полупречникъ управну — дирку — AT до пресеца- ня съ продуженымъ другимъ полупречникомъ MC у точки T : то се управна MD зове синусъ — *sinus* —; часть полупречника AC одъ края A до синуса, т. є. одстояніе AD поперечный синусъ — *sinus versus* —; часть AT геометричне дирке у A тангента — *tangens* —, а продуженый полу- пречникъ MC до пресеца- ня съ истомъ диркомъ, т. є. одстояніе CT секанта — *secans* — лука AM или угла φ , за полупречникъ r .

Изъ узрока што се ове четири пруге, као што ћемо погдніе увидити, при найманьой премени дотичнога угла или нѣгова лука и саме съ места меняю тако, да нѣюва величина свагда само одъ нѣга зависи: наричу се іошъ све четири обштымъ

именомъ тригонометричне — болѣ бы было го-
ніометричне — Функціе или дѣйства тичућегъ се
угла или лука, и означую се слѣдуюћимъ скраће-
нымъ начиномъ.

$$MD = \sin. \varphi, AD = \sin. v. \varphi, AT = \tan. \varphi, \\ CT = \sec. \varphi$$

§. 5.

сл. 1. Продужуюћи на ниже лукъ AM и нѣговъ си-
нусъ MD до међусобногъ пресецања у M_1 : бытѣ
лукъ $AM_1 = AM$ т. е. $\angle ACM = \angle ACM_1 = \varphi$, и да-
кле $\angle MCM_1 = 2\varphi$, а $MD = DM_1 = \frac{1}{2}MM_1$. По томе

Синусъ некогъ угла нѣе ништа друго, но
полутетивка удвоенногъ истогъ угла.

Старіи математици употреблявали су у тригоме-
тріи тетивке место синуса, и они, кои су се при-
томъ служили латинскимъ езикомъ, називали су *in-
scriptae*, а нѣине половине *semissis inscriptae*.
Скраћуюћи ово име у рачуну найпре на *s. ins.*, а поз-
днѣе на *sin.*, постало е по мнѣню неки ауктора
име *sinus*. Други на противъ веле, и то е вѣро-
ватнѣе, да е то име само преводъ, за дотичну
функцію одъ Арапа алегорично употребляване ре-
чи цаибъ, коя као и у латинскомъ значи недра.

§. 6.

Допуна некогъ угла до правога, т. е. допуна
нѣгове мере до єдне четврти круга, назива се нѣ-
говымъ комплементомъ; нѣгова пакъ допуна до
два права угла или по круга, суплементомъ. Ком-
плементъ дакле некогъ угла φ нѣе ништа друго но
нѣгова разлика одъ єдногъ правога угла, или $90^\circ - \varphi$,
а суплементъ разлика одъ два права угла, или
 $180^\circ - \varphi$. Обе те допуне бытѣе, као што е лако

увидити, одрицателне, ако е угаль φ односно већій одъ єдногъ или одъ два права угла.

§. 7.

Ако е у сл. 2. $\angle \varphi + \psi = 90^\circ$, у сл. пакъ 3. $\angle \varphi - \psi =$ сл. 2. $= 90^\circ$: то е по предходећему угаль ψ у оба слу- в 3. чая комплементъ угла φ .

Функціе комплементногъ угла ψ називаю се кофункціяма или садѣйствама угла φ . По на особъ е ME косинусъ — *cosinus* —, BE поперечный косинусъ — *cosinus versus* —, BG котангента — *cotangens* —, а CG косеканта — *cosecans* — угла φ за полупречникъ $AC = r$, коє слѣдуюћимъ начи- номъ означуемо :

$$ME = \cos. \varphi, BE = \cos. v. \varphi, BG = \cot. \varphi, CG = \csc. \varphi.$$

По себи увиђа се, да е обратно $\angle \varphi$ комплементъ угла ψ , и да су нѣгове функціе кофункціе угла ψ .

Додатци. 1.) Изъ саме слике види се, да е $ME = DC$; зато се подъ косинусомъ некогъ угла φ обично разумева одстояніе DC , т. є. одстояніе сре- дишта C одъ синуса. Мы ћемо одъ яко такођеръ то одстояніе називати косинусомъ. — 2.) У §. 4. описане четири функціе угла и сада споменуте нѣгове кофункціе, именую се купно просте или основ- не функціе, за разлику одъ сложены, съ коима ћемо се упознати у позднімъ §§.

II. Свойства основны функція.

§. 8.

Нека су A_1B_1 и A_2B_2 два єданъ на другій у- сл. 4. правна пречника, а $A_1M_1, A_1M_2, A_1M_3, \dots, A_1M_n$ у разне четврти круга допирући луци.

Построивши по §§. 4. и 6. све функціе овы лукова примећавамо, да є нѣово положенѣ, изузимаюћи оно попречны синуса, и косинуса кои се пружаю само на єдну єдину страну, — двояко и єдно другомъ противно, тако: да су по томе, сматраюћи функціе у првой четврти као положителне,

синуси и косеканте у 1. и 2. четврти положителне, а у 3. и 4. одрицателне;

косинуси и секанте у 1. и 4. четврти положителне, у 2. пакъ и 3. одрицателне;

тангенте и котангенте у 1. и 3. четврти положителне, а у 2. и 4. одрицателне; наипосле

попречни синуси и косинуси у свима четвртима положителни.

Одрицателне секанте и косеканте єсу оне, при којима се дотичный полупречникъ, ради пресецања съ тангентомъ или котангентомъ, продужує преко средишта назадъ.

Додатакъ. Функціе лукова већи одъ єдногъ круга, лукова т. є. кои допиру у 5., 6., 7., и т. д. четвртъ, слажу се по положеню, а као што ћемо мало каснѣ видѣти, и величиномъ односно съ оними у 1., 2., 3. и 4. четврти.

§. 9.

Што се тиче величине функція, то находимо простымъ сматранѣмъ слике обзиромъ на предходѣій §.

1.) Умалеванѣмъ лука A_1M_1 умалеваю се такођеръ и нѣгова оба синуса, тангента и секанта

расту на противъ оба косинуса, котангента и косеканта тако, да є

за $A_1M_1 = \alpha = 0$:

$$\sin 0 = \sin. v. 0 = \text{tang. } 0 = 0 ,$$

$$\cos 0 = \cos. v. 0 = \sec. 0 = r , \text{ а}$$

$$\cot. 0 = \text{cosec} = \infty$$

2.) Увећаванѣмъ лука A_1M_1 у првой четврти увећаваю се оба нѣгова синуса, тангента и секанта, а умаляваю се на противъ оба косинуса, котангента и косеканта, тако, да є

за $A_1M_1 = A_1A_2 = 90^\circ$:

$$\sin 90^\circ = \sin. v. 90^\circ = \text{cosec. } 90^\circ = r ,$$

$$\cos 90^\circ = \cos. v. 90^\circ = \cot. 90^\circ = 0, \text{ а}$$

$$\text{tang } 90^\circ = \sec. 90^\circ = \infty$$

3.) У 2. четврти умаляваю се синусъ, тангента и секанта, расту на противъ поперечный синусъ, оба косинуса, котангента и косеканта тако, да є

за $A_1M_1 = A_1A_2B_1 = 180^\circ = 2 R$:

$$\sin. 180^\circ = \text{tang. } 180^\circ = 0 ,$$

$$\sin. v. 180^\circ = 2r ,$$

$$\cos. 180^\circ = \sec. 180^\circ = -r ,$$

$$\cot 180^\circ = -\infty ,$$

$$\text{cosec. } 180^\circ = \infty$$

4.) У 3. четврти расту синусъ, поперечный косинусъ, тангента и секанта, а умаляваю се поперечный синусъ, косинусъ, котангента и косеканта тако, да є

за $A_1M_1 = A_1A_2B_1B_2 = 270^\circ = 3 R$:

$$\sin. 270^\circ = \text{cosec } 270^\circ = r ,$$

$$\sin. v. 270^\circ = r ,$$

$$\cos. 270^\circ = \cot. 270^\circ = 0 ,$$

$$\cos. v. 270^\circ = 2r ,$$

$$\text{tang. } 270^\circ = \infty ,$$

$$\sec. 270^\circ = -\infty$$

5.) У 4. найпосле четврти умаляваю се оба синуса, попречный косинусъ, тангента и секанта, а расту косинусъ, котангента и косеканта, тако да е

$$\begin{aligned} \text{за } A_1M_1 = A_1A_2B_1B_2A_1 = 360^\circ = 4R : \\ \sin. 360^\circ = \sin. u. 360^\circ = \tan. 360^\circ = 0, \\ \cos. 360^\circ = \cos. v. 360^\circ = \sec. 360^\circ = r, \\ \cot. 360^\circ = \operatorname{cosec}. 360^\circ = -\infty \end{aligned}$$

Додатакъ. Сматраюћий функціе лука кои се найпре одъ нулле, а потомъ одъ 90° или четврти круга едва разликуюе, увиђамо: да се у првомъ случаю синусъ и тангента одъ самога лука, а косинусъ и секанта одъ полупречника, у другомъ пакъ случаю синусъ и косеканта одъ полупречника, а косинусъ и котангента одъ нулле приметно ничимъ неразликую. Найпосле да су у првомъ случаю котангента и косеканта, а у другомъ тангента и секанта безъ сваке сумњѣ безконечно велике.

§. 10.

Докученя предходећа два §§. могу се сложити у слѣдуюћу просту, почетнику веома полезну таблицу, у којој *pc* показуе растенѣ, а *ум.* умаляванѣ функція.

	$\angle$ одъ 0°	у I. четвр.	$\angle$ одъ 90°	у II. четвр.	$\angle$ одъ 180°	у III. четвр.	$\angle$ одъ 270°	у IV. четвр.	$\angle$ одъ 360°
синусъ	0	+, рс.	г	+, ум.	0	—, рс.	—г	—, ум.	0
косинусъ	г	+, ум.	0	—, рс.	—г	—, ум.	0	+, рс.	г
попр. синусъ	0	+, рс.	г	+, рс.	2г	+, ум.	г	+, ум.	0
попр. косин.	г	+, ум.	0	+, рс.	г	+, рс.	2г	+, ум.	г
тангента	0	+, рс.	∞	—, ум.	0	+, рс.	∞	—, ум.	0
котангента	∞	+, ум.	0	—, рс.	$-\infty$	+, ум.	0	—, рс.	$-\infty$
секанта	г	+, рс.	∞	—, ум.	—г	—, рс.	$-\infty$	+, ум.	г
косеканта	∞	+, ум.	г	+, рс.	∞	—, ум.	—г	—, рс.	$-\infty$

Изъ ове таблице изводимо іошъ нарочито слѣдуюће две важне приметбе:

1.) Синусъ, поперечный синусъ, тангента и секанта у првой четверти расту, кофункціе на противъ умаляваю се: ако углалъ расте, и обратно.

2.) Немотрѣи на знакъ,
 границе синуса и косинуса єсу 0 — нулла — и полупречникъ,
 „ поперечногъ синуса и попр. косинуса 0 и пречникъ,
 „ тангенте и котангенте 0 и безконечно, наипосле границе секанте и косеканте полупречникъ и безконечно.

Попречный синусъ и косинусъ употребляю се одъ свію функція найманъ, зато іи мы одяко више не ѣмо сматрати.

§. 11.

Найвећій є синусъ, као што смо видели, раванъ полупречнику. Овай синусъ назива се целымъ синусомъ или *sinus totus* и узима се обично, ради простіегъ рачуна, за єдиницу свію осталы функція.

Мы ѣмо одъ сада при свима нашимъ дальимъ испытываняма такођеръ єдиницу сматрати као полупречникъ, докле годъ не условимо другій. Но да бы функціе за полупречникъ 1 разликовали одъ єдноимены функція за другій некій полупречникъ: то ѣе мо оне у будуће свагда малимъ, а ове великимъ писменима започиняти.

За полупречникъ 1 периферія круга равна є 2π , пола круга $= \pi$, а четверть круга $= \frac{1}{2}\pi$. Тога ради писатъ ѣмо одъ яко место четверти круга, по круга и цела круга краће $\frac{1}{2}\pi$, π и 2π .

§. 12.

Ако є у сл. 1. по величини лукъ $AM = AM_1$ сл. 1.
т. є. $\angle ASM = \angle ASM_1 = \varphi$, и точка A нѣювъ заєд-
ничкій почетакъ: то су исти луци по положеню
єданъ другомъ противни, и зато, сматраюћи гор-
нѣ пололенѣ као положително, лукъ є AM поло-
теланъ, а лукъ AM_1 одрицателанъ, или — што є
све идно —, $\angle ASM = +\varphi$, а $\angle ASM_1 = -\varphi$.

Да су єдноимене функціє оба угла по величи-
ни єднаке, увиђавно є по себи, и мы дакле обзи-
ромъ на § 8. налазимо

$$\begin{array}{l} \sin. (-\varphi) = -\sin. \varphi \\ \cos. (-\varphi) = \cos. \varphi \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \tan. (-\varphi) = -\tan. \varphi \\ \cot. (-\varphi) = -\cot. \varphi \end{array} \right.$$

$$\sec. (-\varphi) = \sec. \varphi$$

$$\operatorname{cosec}. (-\varphi) = -\operatorname{cosec}. \varphi$$

кои изрази важе за сваку безъ разлике вели-
чину угла φ .

§. 13.

Ако су (сл. 5.) A_1B_1 и A_2B_2 два єданъ на дру- сл. 5.
гій управна пречника, а по величини $\angle A_1CM_1 =$
 $= \angle A_2CM_2 = \angle B_1CM_3 = \angle B_2CM_4 = \varphi$: то є, изъ лако у-
виђавны — геометричны — узрока, по величини
 $M_2N_2 = N_1C$, $M_3N_3 = M_1N_1$, $M_4N_4 = N_1C$, $M_5N_5 =$
 $= M_1N_1$; обзиромъ дакле на §. 8. и 11.

$$\begin{array}{l} \sin (\frac{1}{2} \pi + \varphi) = \cos \varphi \\ \sin (\pi + \varphi) = -\sin \varphi \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \sin (\frac{3}{2} \pi + \varphi) = -\cos \varphi \\ \sin (2\pi + \varphi) = \sin \varphi \end{array} \right.$$

Поставляюћи у ове изразе $(-\varphi)$ место φ
слѣдує по §. 12.

$$\begin{array}{l} \sin (\frac{1}{2} \pi - \varphi) = \cos \varphi \\ \sin (\pi - \varphi) = \sin \varphi \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \sin (\frac{3}{2} \pi - \varphi) = -\cos \varphi \\ \sin (2\pi - \varphi) = -\sin \varphi \end{array} \right.$$

Овымъ истымъ начиномъ и остале функціє
сматраюћи долазимо наипосле до слѣдуюћи обшты
докученя:

Синусъ	Косинусъ	Тангента	Котангента	Секанта	Косеканта
оАБ ($\frac{1}{2}\pi \pm \varphi$) =					
$\cos \varphi$	$\pm \sin \varphi$	$\mp \cot \varphi$	$\mp \tan \varphi$	$\mp \operatorname{cosec} \varphi$	$\sec \varphi$
оАБ ($\pi \pm \varphi$) =					
$\mp \sin \varphi$	$\pm \cos \varphi$	$\pm \tan \varphi$	$\pm \cot \varphi$	$-\sec \varphi$	$\mp \operatorname{cosec} \varphi$
оАБ ($\frac{1}{2}\pi \pm \varphi$) =					
$-\cos \varphi$	$\pm \sin \varphi$	$\mp \cot \varphi$	$\mp \tan \varphi$	$\pm \operatorname{cosec} \varphi$	$-\sec \varphi$
оАБ ($2\pi \pm \varphi$) =					
$\pm \sin \varphi$	$\cos \varphi$	$\pm \tan \varphi$	$\pm \cot \varphi$	$\sec \varphi$	$\pm \operatorname{cosec} \varphi$

Функціе угла вѣи или маньи одъ 4, 5, 6, 7, 8 или више правы, стов према функціяма основногъ угла φ дотично у истомъ отношенію, као функціе у овой таблиці назначены угла.

III. Међусобно отношенѣ функція.

§. 14.

Построивши функціе некогъ угла $ACM = \varphi$
(сл. 2.) находимо

сл. 2.

а.) изъ триугла MCD

$$\begin{aligned} \overline{MC}^2 &= \overline{MD}^2 + \overline{DC}^2, \text{ т. е.} \\ 1 &= \sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi \\ \text{и одтуда } \left. \begin{aligned} \sin \varphi &= \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} \\ \cos \varphi &= \sqrt{1 - \sin^2 \varphi} \end{aligned} \right\} \dots 1. \end{aligned}$$

б.) изъ триугла ACF

$$\begin{aligned} \overline{CF}^2 &= \overline{AC}^2 + \overline{AF}^2, \text{ или} \\ \sec^2 \varphi &= 1 + \tan^2 \varphi \\ \text{дакле } \left. \begin{aligned} \sec \varphi &= \sqrt{1 + \tan^2 \varphi} \\ \tan \varphi &= \sqrt{\sec^2 \varphi - 1} \end{aligned} \right\} \dots 2. \end{aligned}$$

в.) изъ триугла BCG

$$\begin{aligned} \overline{CG}^2 &= \overline{BC}^2 + \overline{BG}^2, \text{ т. е.} \\ \operatorname{cosec}^2 \varphi &= 1 + \cot^2 \varphi, \text{ и} \\ \text{зато } \left. \begin{aligned} \operatorname{cosec} \varphi &= \sqrt{1 + \cot^2 \varphi} \\ \cot \varphi &= \sqrt{\operatorname{cosec}^2 \varphi - 1} \end{aligned} \right\} \dots 3. \end{aligned}$$

§. 15.

Збогъ подобія триуглова ACF и DCM (иста сл.) имамо далѣ

$AF : AC = DM : DC$ и
 $CF : AC = CM : DC$, то ће рећи
 $\tan \varphi : 1 = \sin \varphi : \cos \varphi$, а
 $\sec \varphi : 1 = 1 : \cos \varphi$, и одтуда

$$\tan \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} \dots\dots 4.$$

$$\text{обратно} \quad \left. \begin{aligned} \sec \varphi &= \frac{1}{\cos \varphi} \\ \cos \varphi &= \frac{1}{\sec \varphi} \end{aligned} \right\} \dots\dots 5.$$

Подобіе пакъ триуглова BCG и ECM подає

$$\begin{aligned} BG : BC &= EM : EC, \\ GC : BC &= MC : EC, \text{ или} \end{aligned}$$

збогъ $EM = CD$, а $EC = MD$:

$$\begin{aligned} BG : BC &= CD : MD, \\ GC : BC &= MC : MD, \text{ то ће рећи} \\ \cot \varphi : 1 &= \cos \varphi : \sin \varphi, \text{ а} \\ \operatorname{cosec} \varphi : 1 &= 1 : \sin \varphi, \text{ дакле} \end{aligned}$$

$$\cot \varphi = \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} \dots\dots 6.$$

$$\text{обратно} \quad \left. \begin{aligned} \operatorname{cosec} \varphi &= \frac{1}{\sin \varphi} \\ \sin \varphi &= \frac{1}{\operatorname{cosec} \varphi} \end{aligned} \right\} \dots\dots 7.$$

§. 16.

Будући є $\frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = 1 : \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi}$, то є по горњему

(образацъ 4.) $\tan \varphi = 1 : \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi}$, но по образцу є 6.

$$\frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} = \cot \varphi, \text{ дакле є}$$

$$\text{и обратно} \quad \left. \begin{aligned} \operatorname{tang} \varphi &= \frac{1}{\cot \varphi} \\ \cot \varphi &= \frac{1}{\operatorname{tang} \varphi} \end{aligned} \right\} \dots 8.$$

§. 17.

Заменяюћи именителѣ у изразима подѣ 5., 7., и 8. съ нѣовымъ вредностима изъ 1., 2., и 3., добыямо редомъ

$$\left. \begin{aligned} \sec \varphi &= \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 \varphi}} \\ \cos \varphi &= \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tang}^2 \varphi}} \\ \operatorname{cosec} \varphi &= \frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2 \varphi}} \end{aligned} \right| \begin{aligned} \sin \varphi &= \frac{1}{\sqrt{1 + \cot^2 \varphi}} \\ \operatorname{tang} \varphi &= \frac{1}{\sqrt{(\operatorname{cosec}^2 \varphi - 1)}} \\ \cot \varphi &= \frac{1}{\sqrt{(\sec^2 \varphi - 2)}} \end{aligned}$$

Поставляюћи обратно за функціе у именителѣима овы разломака нѣове вредности изъ образаца подѣ 5., 7. и 8. налазимо

$$\left. \begin{aligned} \sec \varphi &= \frac{\operatorname{cosec} \varphi}{\sqrt{(\operatorname{cosec}^2 \varphi - 1)}} \\ \cos \varphi &= \frac{\cot \varphi}{\sqrt{1 + \cot^2 \varphi}} \\ \operatorname{cosec} \varphi &= \frac{\sec \varphi}{\sqrt{(\sec^2 \varphi - 1)}} \end{aligned} \right| \begin{aligned} \sin \varphi &= \frac{\operatorname{tang} \varphi}{\sqrt{1 + \operatorname{tang}^2 \varphi}} \\ \operatorname{tang} \varphi &= \frac{\sin \varphi}{\sqrt{1 - \sin^2 \varphi}} \\ \cot \varphi &= \frac{\cos \varphi}{\sqrt{1 - \cos^2 \varphi}} \end{aligned}$$

Найпосле ове разломке преокретаюћи имамо обзиромъ на образце 5., 7. и 8.

$$\begin{array}{l|l}
 \cos \varphi = \frac{\sqrt{(\operatorname{cosec}^2 \varphi - 1)}}{\operatorname{cosec} \varphi} & \operatorname{cosec} \varphi = \frac{\sqrt{(1 + \tan^2 \varphi)}}{\tan \varphi} \\
 \sec \varphi = \frac{\sqrt{(1 + \cos^2 \varphi)}}{\cot \varphi} & \cot \varphi = \frac{\sqrt{(1 - \sin^2 \varphi)}}{\sin \varphi} \\
 \sin \varphi = \frac{\sqrt{(\sec^2 \varphi - 1)}}{\sec \varphi} & \tan \varphi = \frac{\sqrt{(1 - \cos^2 \varphi)}}{\cos \varphi}
 \end{array}$$

§. 18.

Ова докученя показую, да се тригонометричне функціє геометричнымъ и аналитичнымъ путемъ една чрезъ другу, и све чрезъ одну исту изразити даю, кое є, као што ћемо каснїє увидити, одъ врло велике ползе. Сватаюћи иста докученя ради лакшегъ прегледа и веће удобства при позднїемъ употребленю, сва у скупъ, имамо

изразъ	синусомъ	косинусомъ	тангентомъ	котангентъ	секантомъ	косекантъ
синуся	$\sin$	$\sqrt{1 - \cos^2}$	$\frac{\tan}{\sqrt{1 - \tan^2}}$	$\frac{1}{\sqrt{1 + \cot^2}}$	$\frac{\sqrt{\sec^2 - 1}}{\sec}$	$\frac{1}{\operatorname{cosec}}$
косинуса	$\sqrt{1 - \sin^2}$	$\cos$	$\frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2}}$	$\frac{\cot}{\sqrt{1 + \cot^2}}$	$\frac{1}{\sec}$	$\sqrt{\operatorname{cosec}^2 - 1}$
тангенте	$\frac{\sin}{\sqrt{1 - \sin^2}}$	$\frac{\sqrt{1 - \cos^2}}{\cos}$	$\tan$	$\frac{1}{\cot \tan}$	$\sqrt{\sec^2 - 1}$	$\frac{1}{\sqrt{\operatorname{cosec}^2 - 1}}$
котангенте	$\frac{\sqrt{1 - \sin^2}}{\sin}$	$\frac{\cos}{\sqrt{1 - \cos^2}}$	$\frac{1}{\tan}$	$\cot$	$\frac{1}{\sqrt{\sec^2 - 1}}$	$\sqrt{\operatorname{cosec}^2 - 1}$
секанте	$\frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2}}$	$\frac{1}{\cos}$	$\sqrt{1 + \tan^2}$	$\frac{\sqrt{1 + \cot^2}}{\cot}$	$\sec$	$\frac{\operatorname{cosec}}{\sqrt{\operatorname{cosec}^2 - 1}}$
косеканте	$\frac{1}{\sin}$	$\frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2}}$	$\frac{\tan}{\sqrt{1 + \tan^2}}$	$\sqrt{1 + \cot^2}$	$\frac{\sec}{\sqrt{\sec^2 - 1}}$	cosec



Б.) Сложене функціе.

I. Функціе сбира и разлике два угла.

§. 19.

сл. 6.

Ако е (сл. 6.) лукъ $AM = \alpha$, лукъ пакъ $MN = \beta$:
то е лукъ $AN = \alpha + \beta$ и по §. 4. $MP = \sin \alpha$, $CP = \cos \alpha$,
 $NQ = \sin \beta$, $CQ = \cos \beta$, $NR = \sin (\alpha + \beta)$, а $CR =$
 $= \cos (\alpha + \beta)$.

Спустимо $QS \perp AC$, и $QT \perp NR$; бытѣ

1.) триугаль $CMP \sim \triangle CQS$, и зато

$$CM : MP = CQ : QS, \text{ а}$$

$$CM : CP = CQ : CS, \text{ или по горнѣму и}$$

$$\text{збогъ } QS = TR :$$

$$1 : \sin \alpha = \cos \beta : TR,$$

$$1 : \cos \alpha = \cos \beta : CS ; \text{ дакле}$$

$$TR = \sin \alpha \cos \beta \dots\dots\dots (\text{а.})$$

$$CS = \cos \alpha \cos \beta \dots\dots\dots (\text{б.})$$

2.) $\triangle CMP \sim \triangle NQT$, зато

$$CM : MP = NQ : QT, \text{ а}$$

$$CM : CP = NQ : NT, \text{ или збогъ } QT = SR :$$

$$1 : \sin \alpha = \sin \beta : SR$$

$$1 : \cos \alpha = \sin \beta : NT, \text{ и одтуда}$$

$$SR = \sin \alpha \sin \beta \dots\dots\dots (\text{в.})$$

$$NT = \cos \alpha \sin \beta \dots\dots\dots (\text{г.})$$

Равности подѣ (а. и (г. сабираюћи, а равенство
(в. одѣ (б. одузимаюћи добыямо

$$TR + NT = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta, \text{ и}$$

$$CS - SR = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta ;$$

будући е пакъ $TR + NT = NR = \sin (\alpha + \beta)$, а

$CS - SR = CR = \cos (\alpha + \beta)$: то е дакле

$$\sin (\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \dots (I.)$$

$$\cos (\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \dots (II.)$$

§. 20.

Подобнымъ начиномъ могли бы изнаћи и изразе синуса и косинуса разлике два угла. Но ове функціе мы садъ добыямо много простіе аналитичнымъ путемъ поставляюћи т. е. у пређашиѣ $(-\beta)$ место β , кое учинивши имамо

$$\sin (\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos (-\beta) + \cos \alpha \sin (-\beta) \text{ и}$$

$$\cos (\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos (-\beta) - \sin \alpha \sin (-\beta),$$

или обзиромъ на §. 12., т. е. збогъ $\cos (-\beta) = \cos \beta$, а $\sin (-\beta) = -\sin \beta$:

$$\sin (\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \dots (III.)$$

$$\cos (\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \dots (IV.)$$

§. 21.

Ова четири образца синуса и косинуса собира и разлике два угла важе не само за два оштра угла, као што смо у употребљеной за нѣово довођењѣ слики предпоставили, но у обште за ма какова два угла α и β , о чему се лако уверавамо слѣдуюћимъ начиномъ.

Поставимо да е $\angle \alpha$ као и пре оштаръ, угалъ пакъ β тупъ, н. п. $\beta = (90^\circ + \chi) < 180^\circ$; бытѣ по томе

$$\sin (\alpha + \beta) = \sin (\alpha + 90^\circ + \chi)$$

$$= \sin \left[\frac{\pi}{2} + (\alpha + \chi) \right] \dots (\S. 11.)$$

$$= \cos (\alpha + \chi) \dots (\S. 13.),$$

и тимъ истымъ начиномъ

$$\cos(\alpha + \beta) = -\sin(\alpha + \chi).$$

Но углы α и χ по предположенію оштра, дакле ϵ односно по образцамъ II. и I.

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \cos(\alpha + \chi) \\ &= \cos \alpha \cos \chi - \sin \alpha \sin \chi, \quad \text{а} \\ \cos(\alpha + \beta) &= -\sin(\alpha + \chi) \\ &= -\sin \alpha \cos \chi - \cos \alpha \sin \chi\end{aligned}$$

Будући ϵ наипосле, такођеръ по предположенію, $\angle \chi = \beta - 90^\circ = \beta - \frac{\pi}{2} = -(\frac{\pi}{2} - \beta)$, и дакле по §. 13.

$$\sin \chi = \sin \left[-(\frac{\pi}{2} - \beta) \right] = -\sin(\frac{\pi}{2} - \beta) = -\cos \beta,$$

$$\text{а} \quad \cos \chi = \cos \left[-(\frac{\pi}{2} - \beta) \right] = \sin \beta : \text{то } \epsilon. \text{ ове}$$

вредности у предходећа уравненія поставляюћи и ова потомъ уређуюћи,

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ за еданъ оштаръ и едавъ тупъ угаль, као годъ за два оштра.

Поставляюћи садъ да ϵ осимъ угла β јошъ и $\angle \alpha$ тупъ .и н. п. $= (180 + y) < 270^\circ$, налазимо истымъ начиномъ

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \sin(180^\circ + y + 90^\circ + \chi) = \\ &= \sin[270^\circ + (\chi + y)] = -\cos(\chi + y) \\ &= -\cos \chi \cos y + \sin \chi \sin y\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos(\alpha + \beta) &= \cos[270^\circ + (\chi + y)] = \sin(\chi + y) \\ &= \sin \chi \cos y + \cos \chi \sin y, \text{ или, збогъ}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\chi &= \beta - 90^\circ = -(90^\circ - \beta), \quad y = \alpha - 180^\circ = -(180^\circ - \alpha) \\ \text{и дакле } \sin \chi &= -\cos \beta, \quad \cos \chi = \sin \beta, \quad \sin y = \\ &= -\sin(180^\circ - \alpha) = -\sin \alpha, \quad \cos y = \cos(180^\circ - \alpha) = \\ &= -\cos \alpha : -\end{aligned}$$

$$\sin (\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos (\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

и за два условно тупа угла.

До овы исты образаца долазимо, као што сада већ лако увидити можемо, давајући углима α и β и ма какове друге вредности тако, да по томе ньюова, па дакле и изъ нѣи изведены образаца общность, никаковой выше сумнѣи неподлежи

§. 22.

По 15. є §. $\tan (\alpha \pm \beta) = \frac{\sin (\alpha \pm \beta)}{\cos (\alpha \pm \beta)}$, или, мѣсто овы функція ньюове вредности изъ §§. 19. и 20. узимајући

$$\tan (\alpha \pm \beta) = \frac{\sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta}$$

Делећи броителя и именителя овогъ разломка єданпутъ съ $\cos \alpha \cos \beta$, другій путъ пакъ съ $\sin \alpha \sin \beta$, добыямо

$$\left. \begin{aligned} \tan (\alpha \pm \beta) &= \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta} \\ \cot (\alpha \pm \beta) &= \frac{\cot \beta \pm \cot \alpha}{\cot \alpha \cot \beta \mp 1} \end{aligned} \right\} \dots \dots (V.)$$

ове пакъ разломке преокретајући слѣдує (по § 16.)

$$\left. \begin{aligned} \cot (\alpha \pm \beta) &= \frac{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}{\tan \alpha \pm \tan \beta} \\ \tan (\alpha \pm \beta) &= \frac{\cot \alpha \cot \beta \mp 1}{\cot \beta \pm \cot \alpha} \end{aligned} \right\} \dots \dots (VI.)$$

Остале функціє сбира и разлике два угла вр-
ло се редко употреблюю, зато се съ нѣовымъ о-
предельиванѣмъ неѣмо задржавати, но опреде-
лююћи іошъ еданъ за рачунанѣ функція потребанъ
образацъ, приступитѣмо одма другимъ сложеннымъ
функціяма.

Поставляюћи у прво одъ горњи уравненія
подъ V. $\angle \alpha = 45^\circ$, добыямо

$$\operatorname{tang}(45^\circ \pm \beta) = \frac{\operatorname{tang} 45^\circ \pm \operatorname{tang} \beta}{1 \mp \operatorname{tang} 45^\circ \operatorname{tang} \beta}, \text{ будући є пакъ}$$

— изъ лако увиѣавны, геометричны узрока —
 $\operatorname{tang} 45^\circ = 1$, то є

$$\operatorname{tang}(45^\circ \pm \beta) = \frac{1 \pm \operatorname{tang} \beta}{1 \mp \operatorname{tang} \beta} \dots \text{ (VII)}$$

II. Сбиръ и разлика єдноимены функція два угла.

§. 23.

Сабираюћи и одузимаюћи уравненія, I. и III.
а II. и IV. добыямо

$$\left. \begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) &= 2 \sin \alpha \cos \beta, \\ \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) &= 2 \cos \alpha \sin \beta, \\ \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) &= 2 \cos \alpha \cos \beta, \\ \cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) &= -2 \sin \alpha \sin \beta; \end{aligned} \right\} \text{ (v)}$$

поставляюћи пакъ у ове изразе $\alpha + \beta = \varphi$, а
 $\alpha - \beta = \psi$, дакле $\alpha = \frac{1}{2}(\varphi + \psi)$, $\beta = \frac{1}{2}(\varphi - \psi)$,
слѣдує

$$\left. \begin{aligned} \sin \varphi + \sin \psi &= 2 \sin \frac{1}{2}(\varphi + \psi) \cos \frac{1}{2}(\varphi - \psi) \\ \sin \varphi - \sin \psi &= 2 \cos \frac{1}{2}(\varphi + \psi) \sin \frac{1}{2}(\varphi - \psi) \\ \cos \varphi + \cos \psi &= 2 \cos \frac{1}{2}(\varphi + \psi) \cos \frac{1}{2}(\varphi - \psi) \\ \cos \varphi - \cos \psi &= 2 \sin \frac{1}{2}(\varphi + \psi) \sin \frac{1}{2}(\psi - \varphi) \end{aligned} \right\} \dots \text{ (1.)}$$

§. 24.

Обзиромъ на §. 15. (обр. 4. и 6.) имамо

$$\text{tang } \varphi \pm \text{tang } \psi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} \pm \frac{\sin \psi}{\cos \psi}, \text{ а}$$

$$\text{cot } \varphi \pm \text{cot } \psi = \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} \pm \frac{\cos \psi}{\sin \psi}, \text{ сабирањ}$$

пакъ у другимъ частима свршуюћи

$$\text{tang } \varphi \pm \text{tang } \psi = \frac{\sin \varphi \cos \psi \pm \cos \varphi \sin \psi}{\cos \varphi \cos \psi} \text{ и}$$

$$\text{cot } \varphi \pm \text{cot } \psi = \frac{\sin \psi \cos \varphi \pm \cos \psi \sin \varphi}{\sin \varphi \sin \psi}, \text{ т. е.}$$

$$\left. \begin{aligned} \text{tang } \varphi \pm \text{tang } \psi &= \frac{\sin (\varphi \pm \psi)}{\cos \varphi \cos \psi} \\ \text{а } \text{cot } \varphi \pm \text{cot } \psi &= \frac{\sin (\psi \pm \varphi)}{\sin \varphi \sin \psi} \end{aligned} \right\} \dots \dots (2.)$$

§. 25.

Деобомъ сваке равености подъ (1. — §. 23. — чрезъ остале три, добыямо дванаестъ врло потребны образаца, одъ кои наводимо само оне, кои постаю деобомъ прве чрезъ оне друге, оставляюћи налазенъ осталы почетнику на упражненіе.

$$\frac{\sin \varphi + \sin \psi}{\sin \varphi - \sin \psi} = \text{tang } \frac{1}{2} (\varphi + \psi) \text{cot } \frac{1}{2} (\varphi - \psi)$$

или место котангенте узимаюћи по §. 16. тангенту

$$\frac{\sin \varphi + \sin \psi}{\sin \varphi - \sin \psi} = \frac{\text{tang } \frac{1}{2} (\varphi + \psi)}{\text{tang } \frac{1}{2} (\varphi - \psi)} \dots (3.)$$

$$\frac{\sin \varphi + \sin \psi}{\cos \varphi + \cos \psi} = \operatorname{tang} \frac{1}{2}(\varphi + \psi) \dots \dots (4)$$

$$\begin{aligned} \frac{\sin \varphi + \sin \psi}{\cos \varphi - \cos \psi} &= \frac{\cos \frac{1}{2}(\varphi - \psi)}{\sin \frac{1}{2}(\psi - \varphi)} \\ &= \frac{\cos \left[-\frac{1}{2}(\psi - \varphi) \right]}{\sin \frac{1}{2}(\psi - \varphi)} \end{aligned}$$

$$\text{или збогъ } \cos \left[-\frac{1}{2}(\psi - \varphi) \right] = \cos \frac{1}{2}(\psi - \varphi) :$$

$$\frac{\sin \varphi + \sin \psi}{\cos \varphi - \cos \psi} = \cot \frac{1}{2}(\psi - \varphi) \dots \dots (5)$$

У ова три §§. определѣни образци есу у практики одъ найвеће ползе по томе, што се нѣовомъ помоћи логаритми и онде могу употребити, гди то иначе нѣв могуће. Мы ћемо се о томе довольно уверити при разрешеню триуглова.

III. Функціе двогубогъ угла и полуугла.

§. 26.

Поставляюћи у образце синуса, косинуса, тангенте и котангенте сбира два угла (§. 19. и 22.) $\angle \beta = \alpha$, слѣдує

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha \dots \dots (1)$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \dots \dots (2)$$

$$\begin{aligned} \operatorname{tang} 2\alpha &= \frac{2 \operatorname{tang} \alpha}{1 - \operatorname{tang}^2 \alpha} \left\{ \dots \dots (3) \right. \\ &= \frac{2 \cot \alpha}{\cot^2 \alpha - 1} \left. \right\} \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} \cot 2\alpha &= \frac{1 - \tan^2 \alpha}{2 \tan \alpha} \\ &= \frac{\cot^2 \alpha - 1}{2 \cot \alpha} \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots (4)$$

У другомъ пакъ одъ овы уравненія найпре косинусъ синусомъ а потомъ обратно овай онымъ заменяюћи добыямо

$$\left. \begin{aligned} \cos 2\alpha &= 1 - 2 \sin^2 \alpha \\ \text{и } \cos 2\alpha &= 2 \cos^2 \alpha - 1 \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots (5)$$

два образца, у коима є, као што видимо, косинусъ двогубогъ угла израженъ єданпутъ самымъ синусомъ, а другій путъ самымъ косинусомъ проста-га угла.

§. 27.

Оределяюћи изъ предходећа два уравненія $\sin \alpha$ и $\cos \alpha$, и наѣне нѣове вредности потомъ деобомъ саюжаваюћи. добыямо редомъ

$$\left. \begin{aligned} \sin \alpha &= \sqrt{\frac{1 - \cos 2\alpha}{2}} \\ \cos \alpha &= \sqrt{\frac{1 + \cos 2\alpha}{2}} \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots (6)$$

$$\left. \begin{aligned} \tan \alpha &= \sqrt{\frac{1 - \cos 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha}} \\ \cot \alpha &= \sqrt{\frac{1 + \cos 2\alpha}{1 - \cos 2\alpha}} \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots (7)$$

Разрешаваюћи пакъ прво уравненіє подъ (3) у смотреню $\tan \alpha$ налазимо іошъ

$$\tan \alpha = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + \tan^2 2\alpha}}{\tan 2\alpha} \dots (8)$$

§. 28.

Изъ уравненія подъ (7. слѣдуетъ далѣ

$$\left. \begin{aligned} \cos 2\alpha &= \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} \\ \text{и } \cos 2\alpha &= \frac{\cot^2 \alpha - 1}{\cot^2 \alpha + 1} \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots (9.$$

Найпосле збогъ $\tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha}$ имамо

$$\sin 2\alpha = \tan 2\alpha \cdot \cos 2\alpha.$$

Заменяюћи у овомъ изразу $\tan 2\alpha$ съ нѣ-
нымъ вредностима подъ (3., $\cos 2\alpha$ пакъ са пред-
ходећима подае се

$$\left. \begin{aligned} \sin 2\alpha &= \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} \\ \text{и } \sin 2\alpha &= \frac{2 \cot 2\alpha}{\cot^2 \alpha + 1} \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots (10.$$

§. 29.

Поставляюћи сада у уравненія подъ (6. и (7.

$2\alpha = \beta$, дакле $\alpha = \frac{\beta}{2}$, слѣдуетъ

$$\left. \begin{aligned} \sin \frac{\beta}{2} &= \sqrt{\frac{1}{2} (1 - \cos \beta)} \\ \cos \frac{\beta}{2} &= \sqrt{\frac{1}{2} (1 + \cos \beta)} \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots (11.$$

$$\left. \begin{aligned} \tan \frac{\beta}{2} &= \sqrt{\frac{1 - \cos \beta}{1 + \cos \beta}} \\ \cot \frac{\beta}{2} &= \sqrt{\frac{1 + \cos \beta}{1 - \cos \beta}} \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (12.$$

Истымъ начиномъ добыямо изъ уравненія подъ
(9. и (10., (3. и (4.

$$\left. \begin{aligned} \cos \beta &= \frac{1 - \tan^2 \frac{1}{2} \beta}{1 + \tan^2 \frac{1}{2} \beta} \\ &= \frac{\cot^2 \frac{1}{2} \beta - 1}{\cot^2 \frac{1}{2} \beta + 1} \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (13.$$

$$\left. \begin{aligned} \sin \beta &= \frac{2 \tan \frac{1}{2} \beta}{1 + \tan^2 \frac{1}{2} \beta} \\ &= \frac{2 \cot \frac{1}{2} \beta}{1 + \cot^2 \frac{1}{2} \beta} \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (14.$$

$$\left. \begin{aligned} \tan \beta &= \frac{2 \tan \frac{1}{2} \beta}{1 - \tan^2 \frac{1}{2} \beta} \\ &= \frac{2 \cot^2 \frac{1}{2} \beta}{\cot^2 \frac{1}{2} \beta - 1} \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (15.$$

$$\left. \begin{aligned} \cot \beta &= \frac{1 - \tan^2 \frac{1}{2} \beta}{2 \tan \frac{1}{2} \beta} \\ &= \frac{\cot^2 \frac{1}{2} \beta - 1}{2 \cot \frac{1}{2} \beta} \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (16.$$

§. 30.

Броителя и именителя подкорены разломака у
изразима подъ (12. едавпуть съ $(1 - \cos \beta)$, другій
путь пакъ съ $(1 + \cos \beta)$ мложеѣи, и потомъ $(1 - \cos^2 \beta)$
по §. 14. синусомъ заменяюѣи добыямо іошъ

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{tang} \frac{\beta}{2} &= \frac{1 - \cos \beta}{\sin \beta} \\ &= \frac{\sin \beta}{1 + \cos \beta} \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots (17.$$

$$\left. \begin{aligned} \cot \frac{\beta}{2} &= \frac{\sin \beta}{1 - \cos \beta} \\ &= \frac{1 + \cos \beta}{\sin \beta} \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots (18.$$

Поставляюћи пакъ у образацъ подъ (8. $2\alpha = \beta$,
слѣдуе

$$\operatorname{tang} \frac{\beta}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + \operatorname{tang}^2 \beta}}{\operatorname{tang} \beta} \dots (19.$$

§. 31.

Заменяюћи у изразима подъ (11. $\cos \beta$ по §.
14. синусомъ, налазимо

$$\sin \frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{1 - \sin^2 \beta}}{2}} \text{ и}$$

$$\cos \frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{1 + \sqrt{1 - \sin^2 \beta}}{2}} ; \text{ брoителъ}$$

пакъ овы корена, т. е. $\sqrt{1 \mp \sqrt{1 - \sin^2 \beta}}$
познатымъ начиномъ — као сурдске корене — о-
пределяюћи подае се

$$\left. \begin{aligned} \sin \frac{\beta}{2} &= \frac{1}{2} \sqrt{1 + \sin \beta} - \frac{1}{2} \sqrt{1 - \sin \beta} \\ \cos \frac{\beta}{2} &= \frac{1}{2} \sqrt{1 + \sin \beta} + \frac{1}{2} \sqrt{1 - \sin \beta} \end{aligned} \right\} (20.$$

Найпосле, првый одъ ова два израза другимъ делећи

$$\operatorname{tang} \frac{\beta}{2} = \frac{\sqrt{1 + \sin \beta} - \sqrt{1 - \sin \beta}}{\sqrt{1 + \sin \beta} + \sqrt{1 - \sin \beta}} \dots (21.)$$

В) Преобраћанѣ функція и нѣгово броєвно определяванѣ — рачунанѣ —.

І. Преобраћанѣ функція.

§. 32.

Сви до яко изнађени, међусобно отношенѣ тригонометричны функція показуюћи образци тичу се, као што знамо, полупречника 1. Почемъ нама пакъ исти образци у практики више пута требаю и у односу на другій некій, условльный полупречникъ; то е нужно показати, како се изъ нѣи добыяю истовестни образци за свакій у обще полупречникъ r .

У име тога напишимо изъ врха угла α (сл. 7.) међу нѣгове краке два лука AB и ab съ разнымъ полупречницама $AC = r$ и $aC = \rho$, и построимо потомъ истога угла функціе за оба ова полупречника. То учинивши подае се

сл. 7.

1.) Збогъ подобія триглова BCD и bdC ,
 $BD : bd = DC : dC = BC : bC$;

2.) изъ подобія пакъ триглова GAC и gaC ,
 $AG : ag = GC : gC = AC : aC$; найпосле

3.) изъ подобія триглова ENC и ehC ,
 $EN : eh = NC : hC = EC : eC$.

То ће рећи

$$\sin \alpha_r : \sin \alpha_\rho = \cos \alpha_r : \cos \alpha_\rho = r : \rho,$$

$$\tan \alpha_r : \tan \alpha_\rho = \sec \alpha_r : \sec \alpha_\rho = r : \rho,$$

$$\cot \alpha_r : \cot \alpha_\rho = \operatorname{cosec} \alpha_r : \operatorname{cosec} \alpha_\rho = r : \rho : \text{при}$$

чему функціямъ придата писма r и ρ показую комъ полупречнику исте функціе принадлеже.

Изъ овы сразмерности видимо, да є отношеніє єдноимены функція єдногъ истогъ угла за разне полупречнике равно отношению исты полупречника тако, да ако є полупречникъ r н. п. два пута веіій одъ полупречника ρ , свака функція угла α за полупречникъ r такођеръ двапутъ веіа єсть одъ єдноимене функціе за полупречникъ ρ .

§. 33.

Поставляюћи садъ у горні сразмерности полупречникъ $\rho = 1$, и разликуюћи єдноимене функціе међу собомъ условльнымъ у §. 11. начиномъ, налазимо, єдне чрезъ друге определяюћи,

$$\begin{aligned} \sin \alpha &= r. \sin \alpha, \cos \alpha = r. \cos \alpha, \tan \alpha = r. \tan \alpha, \\ \sec \alpha &= r. \sec \alpha, \cot \alpha = r. \cot \alpha, \operatorname{cosec} \alpha = \\ &r. \operatorname{cosec} \alpha; \text{ на противъ пакъ} \end{aligned}$$

$$\sin \alpha = \frac{\sin \alpha}{r}, \cos \alpha = \frac{\cos \alpha}{r}, \tan \alpha = \frac{\tan \alpha}{r},$$

$$\sec \alpha = \frac{\sec \alpha}{r}, \cot \alpha = \frac{\cot \alpha}{r}, \operatorname{cosec} \alpha = \frac{\operatorname{cosec} \alpha}{r}$$

У обште, означуюћи съ $f(\alpha)$ сваку функцію угла α за полупречникъ 1, съ $F(\alpha)$ пакъ єдноиме-

ну нѣгову функцію за полупречникъ r , имамо

$$F(\alpha) = r \cdot f(\alpha), \text{ а } f(\alpha) = \frac{F(\alpha)}{r}; \text{ то ће рећи:}$$

Функціе некогъ угла α за полупречникъ 1 преобраћаю се у едноимене функціе за другій некій полупречникъ r , ако се съ овымъ полупречникомъ помложе; Функціе напротивъ за полупречникъ r преводе се у едноимене функціе за полупречникъ 1, ако се съ истымъ полупречникомъ r разделе.

§. 34.

Да бы ово правило примерима већма обяснили, то преобратимо изнађене за полупречникъ 1 образце 1.) $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$, 2.) $\tan \alpha = \frac{1}{\cot \alpha}$ и 3.) $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$, у едноимене образце угла α за полупречникъ r .

По горњему е

$$\sin \alpha = \frac{\sin \alpha}{r}, \cos \alpha = \frac{\cos \alpha}{r}, \tan \alpha = \frac{\tan \alpha}{r}, \cot \alpha = \frac{\cot \alpha}{r}, \cos(\alpha \pm \beta) = \frac{\cos(\alpha \pm \beta)}{r}, \cos \beta = \frac{\cos \beta}{r}$$

$\sin \beta = \frac{\sin \beta}{r}$; поставляюћи дакле у горњъ изразе ове вредности место функція за полупречникъ 1, слѣдуе

$$1.) \frac{\sin \alpha}{r} = \sqrt{1 - \frac{\cos^2 \alpha}{r^2}} = \frac{\sqrt{r^2 - \cos^2 \alpha}}{r}$$

и одтуда

$$\sin \alpha = \sqrt{r^2 - \cos^2 \alpha},$$

$$2.) \frac{\text{Tang } \alpha}{r} = 1 : \frac{\text{Cot } \alpha}{r} = \frac{r}{\text{Cot } \alpha}, \text{ дакле}$$

$$\text{Tang } \alpha = \frac{r}{\text{Cot } \alpha}; \text{ наипосле}$$

$$3.) \frac{\text{Cos } (\alpha \pm \beta)}{r} = \frac{\text{Cos } \alpha}{r} \cdot \frac{\text{Cos } \beta}{r} \pm \frac{\text{Sin } \alpha}{r} \cdot \frac{\text{Sin } \beta}{r} =$$

$$= \frac{\text{Cos } \alpha \text{ Cos } \beta \pm \text{Sin } \alpha \text{ Sin } \beta}{r^2}, \text{ одатле пакъ}$$

$$\text{Cos } (\alpha \pm \beta) = \frac{\text{Cos } \alpha \text{ Cos } \beta \pm \text{Sin } \alpha \text{ Sin } \beta}{r}$$

II. Рачунаиѣ функція за полупречникъ 1.

§ 35.

Велика полза, кою иначе подаю гоніометрич-
не функціе у практики, сасвимъ бы се изгубила, да
и мы при свакомъ употреблѣнїю найпре морамо
израчунати. Зато су исте функціе одавна веѣъ
израчуване и за употреблѣнїе у удобне таблице сло-
жене тако, да нама садъ само іошъ остае показа-
ти, коимъ се начиномъ могу определити и како се
употребляваю.

Прво урадитъ ћемо сада, и у томъ обзиру и-
мамо приметити, да се гоніометричне функціе най-
болѣ налазе посредствомъ безконачны редова.
Почемъ пакъ мы рачуна съ таковымъ редовима —
као предметъ више аналитике, коя ће текъ слѣ-
довати — іошъ незнамо, то смо принуђени служи-
ти се за исту цѣль другимъ, такођеръ обичнымъ,
но нешто теготнїимъ начиномъ, при комъ употре-
блявамо само нека доякошња наша геометрична и
гоніометрична докученя. У осталомъ рачунали мы

поменуте функціе коимъ годъ начиномъ, по смислу §. 13. ніе потрібно определити выше, него само функціе прве четверти. Будући є пакъ по §. 7. свакимъ синусомъ определѣнь свагда и єданъ косинусъ; и будући се по §. 18. све остале функціе синусомъ и косинусомъ лако могу изразити: то є найпосле довольно, ако изнаѣмо само синусе поменуте четверти. До овы, служећи се, као што горе рекосмо, само доякошнѣимъ нашимъ докученяма, долазимо найпростіе слѣдуюћимъ путемъ.

§. 36.

По §. є 5. $\sin \varphi = \frac{1}{2} \text{ chord. } 2\varphi$; изъ геометріе пакъ знамо, да є за полупречникъ 1

а.) страна правилногъ триугла или $\text{chord. } 60^\circ = 1$. (полупречнику);

б.) страна правилногъ триугла т. є. $\text{chord. } 120^\circ = \sqrt{3}$;

в.) страна квадрата, то ће рећи $\text{chord. } 90^\circ = \sqrt{2}$; найпосле

г.) страна правилногъ 10° угла или $\text{chord. } 36^\circ = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$; дакле є на основу горнѣгъ о-
бразца

$$\sin. 30^\circ = \cos. 60^\circ = \frac{1}{2} \text{ chord. } 60^\circ \\ = \frac{1}{2} = 5,$$

$$\sin. 60^\circ = \cos. 30^\circ = \frac{1}{2} \text{ chord. } 120^\circ \\ = \frac{1}{2} \sqrt{3} = '8660254$$

$$\sin. 45^\circ = \cos. 45^\circ = \frac{1}{2} \text{ chord. } 90^\circ \\ = \frac{1}{2} \sqrt{2} = '7071068$$

$$\sin. 18^\circ = \cos. 72^\circ = \frac{1}{2} \text{ chord. } 36^\circ \\ = \frac{1}{2} \cdot \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \\ = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4} = '3090170$$

§. 37.

Поставляюћи садъ у образацъ I. §-а 19. и у образацъ III. §. 20., $\alpha = 60^\circ$, а $\beta = 45^\circ$ добыямо по првомъ

$\sin 105^\circ$, или збогъ $\sin (\pi - \varphi) = \sin \varphi$ (§. 13);

$$\begin{aligned}\sin 75^\circ &= \cos 15^\circ = \sin 60^\circ \cos 45^\circ + \cos 60^\circ \sin 45^\circ \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{2} (\sqrt{3} + 1) = .9659257,\end{aligned}$$

а по другомъ

$$\sin 15^\circ = \cos 75^\circ = \frac{1}{4} \sqrt{2} (\sqrt{3} - 1) = .2588189$$

Заменяюћи пакъ у истымъ образцыма α съ 18° , а β съ 15° , слѣдую

$$\begin{aligned}\text{збогъ } \cos 18^\circ &= \sqrt{1 - \sin^2 18^\circ} = \\ &= \sqrt{1 - \left[\frac{1}{4} (-1 + \sqrt{5}) \right]^2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{5 + \sqrt{5}}{2}},\end{aligned}$$

изъ првога

$$\begin{aligned}\sin 33^\circ = \cos 57^\circ &= \frac{\sqrt{2}}{16} (-1 + \sqrt{5})(1 + \sqrt{3}) + \\ &+ \frac{\sqrt{2}}{8} (-1 + \sqrt{3}) \sqrt{\frac{5 + \sqrt{5}}{2}} = .5446390\end{aligned}$$

а изъ другога

$$\begin{aligned}\sin 3^\circ = \cos 87^\circ &= \frac{\sqrt{2}}{16} (-1 + \sqrt{5})(1 + \sqrt{3}) \\ &- \frac{\sqrt{2}}{8} (-1 + \sqrt{3}) \sqrt{\frac{5 + \sqrt{5}}{2}} = .0523360\end{aligned}$$

§. 38.

Найпосле, заменяюћи іощъ у првомъ образцу §а 31. подъ 20, т. е. у

$$\sin \frac{\beta}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{(1 + \sin \beta)} - \frac{1}{2} \sqrt{(1 - \sin \beta)},$$

редомъ β съ 3° , $\frac{3^\circ}{2}$, $\frac{3^\circ}{4} = 45'$, $\frac{3^\circ}{8} = \frac{45'}{2}$, $\frac{3^\circ}{16} = \frac{45'}{4}$ и т. д. до $\frac{45'}{64}$: добыямо после две последнѣ замены

$$\sin \frac{45'}{32} = '0002090, \text{ и}$$

$$\sin \frac{45'}{64} = '0002045$$

Сравнюћи ова два синуса међу собомъ видимо, да в последний половина предходећега, и отуда основано заключаемо, да в отношенѣ овако малы синуса равно отношению нѣковы лукава. Ползуюћи се овымъ докученѣмъ налазимо

$$\sin \frac{45'}{64} : \sin 1' = \frac{45'}{64} : 1, \text{ и одатле, место}$$

$$\sin \frac{45'}{64} \text{ горню вредность поставляюћи,}$$

$$\sin 1' = '0002908$$

§. 39.

Дошавши овымъ начиномъ еданпутъ до синуса едногъ минута, опредѣлюемо затымъ посредствомъ истога найпре све манѣ синусе, а после помоћу іошѣ неки одъ овы и све остале веће.

Прве добыямо врло просто поставляюћи ій по горнѣмъ докученю, према синусу еднога минута у онако исто отношенѣ, као дотичный лукъ према едномъ минуту или $60''$. Тако н. п. имамо по томе за синусъ одъ $24''$ сразмерность

$\sin 24'' : \sin 60'' = 24 : 60$, или, место $\sin 60'' =$
 $= \sin 1'$ нађену нѣгову вредность узимаючи,

$\sin 24'' : '0002908 = 24 : 60$; изъ чега слѣдуетъ

$$\sin 24'' = \frac{24}{60} \times '0002908 = '0001163$$

О ономъ рачунаню маньи синуса иоле размишляваюћи увиђамо, да е довольно определити показанымъ начиномъ само синусе одъ 31'', 37'', 41'', 47'', 53'', 59'', и ма кои іошъ еданъ маный, еръ се остави, на основу оногъ истога докученя, лакше добыяю мложенѣмъ и деобомъ последнѣга, а после опетъ мложенѣмъ и деобомъ тымъ начиномъ изнађены, съ некимъ, лако докучливвымъ броевима. Тако и. ѣ. определяючи осимъ поменути шесть синуса само іошъ синусъ одъ 6'' — кои врло лако налазимо деобомъ синуса одъ 1' броемъ 10 —, добыямо изъ истога деобомъ съ 2 и 3 синусе одъ 3'' и 2''; мложенѣмъ пакъ съ 2 и 3 синусе одъ 12'' и 18''. Мложенѣмъ затымъ синуса одъ 2'' съ 2, 5, 7 и другимъ броевима, слѣдую синуси одъ 4'', 10'', 14'' и други; мложенѣмъ пакъ синуса одъ 3'' съ 3, или деобомъ синуса одъ 18'' съ 2, подае се синусъ одъ 9'', и подобнымъ безъ сумнѣ лакимъ начиномъ и сви остави.

§. 40.

Веће синусе налазимо посредствомъ синуса 1' и неки маньи можда найудобнѣе слѣдующимъ начиномъ.

Изъ првогъ образца подъ (v. у §. 23. слѣдуетъ

$$\sin (\alpha + \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta - \sin (\alpha - \beta)$$

а по замени $\cos \beta$ нѣговымъ подаюћомъ се вредно-

сти изъ првогъ образца подъ (11. у §. 29. $\cos \beta =$
 $= 1 - 2 \sin^2 \frac{\beta}{2}$,

$\sin (\alpha + \beta) = 2 \sin \alpha - 4 \sin \alpha \sin^2 \frac{\beta}{2} -$
 $-\sin (\alpha - \beta)$, или, увидавномъ пременомъ десне части,

$$\sin (\alpha + \beta) = \sin \alpha + [\sin \alpha - \sin (\alpha - \beta)] -$$

$$- 4 \sin \alpha \sin^2 \frac{\beta}{2}$$

Заменяюћи садъ у овомъ, тако названомъ
 Деламбровомъ — *Delambre* — образцу, β съ 1", α
 пакъ редомъ съ 1', 1' 1", 1' 2", 1' 3" и т. д. добыямо
 све веће синусе и косинусе одъ секунде до секун-
 де, као што изъ слѣдуюћи неколико примера ви-
 дити можемо.

$$\sin 1' 1'' = \cos 89^\circ 58' 59'' = \sin 1' + (\sin 1' - \sin 59'') -$$

$$- 4 \sin 1' \sin^2 \frac{1''}{2}$$

$$\sin 1' 2'' = \cos 89^\circ 58' 58'' = \sin 1' 1'' + (\sin 1' 1'' -$$

$$- \sin 1') - 4 \sin 1' 1'' \sin^2 \frac{1''}{2}$$

$$\sin 1' 3'' = \cos 89^\circ 58' 57'' = \sin 1' 2'' +$$

$$+ (\sin 1' 2'' - \sin 1' 1'') - 4 \sin 1' 2'' \sin^2 \frac{1''}{2}$$

.....

$$\sin 1' 59'' = \cos 89^\circ 58' 1'' = \sin 1' 58'' +$$

$$+ (\sin 1' 58' - \sin 1' 57'') - 4 \sin 1' 58'' \sin^2 \frac{1''}{2}$$

$$\sin 2' = \cos 89^\circ 58' = \sin 1' 59'' + (\sin 1' 59'' -$$

$$- \sin 1' 58'') - 4 \sin 1' 59'' \sin^2 \frac{1''}{2}$$

$$\sin 1' 2'' = \cos 89^\circ 57' 59'' = \sin 2' + (\sin 2' - \sin 1' 59'') - 4 \sin 2' \sin^2 \frac{1''}{2}$$

.....

$$\sin 59' 59'' = \cos 89^\circ 0' 1'' = \sin 59' 58'' + (\sin 59' 58'' - \sin 59' 57'') - 4 \sin 59' 58'' \sin^2 \frac{1''}{2}$$

$$\sin 1^\circ = \cos 89^\circ = \sin 59' 59'' + (\sin 58' 59'' - \sin 59' 58'') - 4 \sin 59' 59'' \sin^2 \frac{1''}{2}$$

.....

.....

$$\sin 15^\circ = \cos 75^\circ = \sin 14^\circ 59' 59'' + (\sin 14^\circ 59' 59'' - \sin 14^\circ 59' 58'') - 4 \sin 14^\circ 59' 59'' \sin^2 \frac{1''}{2}$$

.....

.....

§. 41.

Обичне табице гоніометричны функція садрже ове само за лукове одъ 10 до 10', минута до минута, или найвише одъ 10 до 10''; остале пакъ определяю се при таковымъ табицама по потреби особитымъ начиномъ, съ коимъ ћемо се мы упознати на надлежномъ месту поздніе.

Рачунаюћи синусе за такове табице 1.) само за лукове одъ минута до минута, валя у истомъ деламбровомъ образцу заменити β съ 1', α пакъ редомъ съ 1', 2', 3', и т. д. чимъ добыямо

$$\sin 2' = \cos 89^\circ 58' = \sin 1' + (\sin 1' - \sin 0') - 4 \sin 1' \sin^2 30''$$

$$\sin 3' = \cos 89^\circ 57' = \sin 2' + (\sin 2' - \sin 1') - 4 \sin 2' \sin^2 30''$$

$$\sin 4' = \cos 89^\circ 56' = \sin 3' + (\sin 3' - \sin 2') - 4 \sin 3' \sin^2 30''$$

.

Рачунаюћи ий пакъ 2.) само одъ 10 до 10', треба найпре овимъ начиномъ определити синусъ одъ 10', а потомъ у истомъ образцу β заменить съ 10', а α редомъ съ 10', 20', 30', и т. д. При томъ рачуну имамо

$$\sin 20' = \cos 89^\circ 40' = \sin 10' + (\sin 10' - \sin 0') - 4 \sin 10' \sin^2 5'$$

$$\sin 30' = \cos 89^\circ 30' = \sin 20' + (\sin 20' - \sin 10') - 4 \sin 20' \sin^2 5'$$

.

Найпосле 3.) определяюћи синусе одъ 10 до 10'', морамо β заменить съ 10'', а пакъ редомъ съ 10'', 20'', 30'', и т. д., чимъ находимо

$$\sin 20'' = \cos 89^\circ 59' 40'' = \sin 10'' + (\sin 20'' - \sin 0'') - 4 \sin 10'' \sin^2 5''$$

$$\sin 30'' = \cos 89^\circ 59' 30'' = \sin 20'' + (\sin 20'' - \sin 10'') - 4 \sin 20'' \sin^2 5''$$

.

$$\sin 1' 10'' = \cos 89^\circ 58' 50'' = \sin 1' + (\sin 1' - \sin 50'') - 4 \sin 1' \sin^2 5''$$

.

$$\sin 2^\circ 3' 40'' = \cos 87^\circ 56' 20'' = \sin 2^\circ 3' 30'' +$$

$$+ (\sin 2^\circ 3' 30'' - \sin 2^\circ 3' 20'') - 4 \sin 2^\circ 3' 30'' \sin^2 5''$$

.....

§. 42.

Синусе лукова већи одъ 60° и косинусе одъ тога мањи лукова определяемо лакше посредствомъ образца

$$\sin (60^\circ + \beta) = \sin (60^\circ - \beta) + \sin \beta$$

заменяючи у истомъ β съ другимъ мањимъ угломъ, $\sin \beta$ дакле већъ изречунанимъ синусима исты угла. Тако н. п. налазимо поставляючи β редомъ = $1', 2', \dots 1^\circ 10', 1^\circ 20', \dots 15^\circ 3' 10', 15^\circ 3' 20'', \dots$

$$\sin 60^\circ 1' = \cos 29^\circ 59' = \sin 60^\circ + \sin 1'$$

$$\sin 60^\circ 2' = \cos 29^\circ 58' = \sin 60^\circ 1' + \sin 2'$$

.....

$$\sin 61^\circ 10' = \cos 28^\circ 50' = \sin 58^\circ 50' + \sin 1^\circ 10'$$

$$\sin 61^\circ 20' = \cos 28^\circ 40' = \sin 58^\circ 40' + \sin 1^\circ 20'$$

.....

$$\sin 75^\circ 3' 10'' = \cos 14^\circ 56' 50'' = \sin 44^\circ 56' 50'' + \sin 15^\circ 3' 10''$$

$$\sin 75^\circ 3' 20'' = \cos 14^\circ 56' 40'' = \sin 44^\circ 56' 40'' + \sin 15^\circ 3' 20''$$

.....

Употребляемый при овомъ образцѣ добыямо изъ другою образца подъ (v у §. 23. поставляючи у истомъ $\alpha = 60^\circ$; чимъ слѣдуетъ

$$\sin (60^\circ + \beta) = \sin (60^\circ - \beta) = 2 \cos 60^\circ \sin \beta,$$

или збогъ $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ (§. 36. г.)

$$\sin (60^\circ + \beta) - \sin (60^\circ - \beta) = \sin \beta; \text{ и одгуда}$$

$$\sin (60^\circ + \beta) = \sin (60^\circ - \beta) + \sin \beta$$

§. 43.

Израчунавши овимъ безъ сумнѣ vrlo лакимъ начиномъ, све синусе и косинусе прве четврти, определяемо затымъ посредствомъ нѣи тангенте, служећи се при томъ наиболѣ познатымъ већъ образцемъ $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$, кои се логаритмички рачунати може.

Съ тангентама, као што е лако увидити, добыемо уедно и котангенте, ерѣ е по §. 13. $\tan \alpha = \cot \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right)$, т. е. свака тангента равна едной котангенти. Остале пакъ функціе, изъ узрока, што се обично неупотреблюю, нерачунаю се.

§. 44.

Тангенте лукова већи одъ 45° , израчунавши найпре све манѣ, добыемо лакше посредствомъ овы манѣи замѣняюћи у образцу

$$\tan (45^\circ + \beta) = \tan (45^\circ - \beta) - 2 \tan 2 \beta$$

лукъ β съ манѣимъ луцима одъ 45° .

Образацъ овай налазимо слѣдуюћимъ начиномъ.

По §. е 23. обр. подъ VII.

$$\tan (45^\circ + \beta) = \frac{1 + \tan \beta}{1 - \tan \beta}, \text{ а}$$

$$\text{tang } (45^\circ - \beta) = \frac{1 - \text{tang } \beta}{1 + \text{tang } \beta} ; \text{ дакле}$$

$$\begin{aligned} \text{tang } (45^\circ + \beta) - \text{tang } (45^\circ - \beta) &= \frac{4 \cdot \text{tang } \beta}{1 - \text{tang}^2 \beta} = \\ &= 2 \cdot \frac{2 \text{ tang } \beta}{1 - \text{tang}^2 \beta}, \text{ или, збогъ } \frac{2 \text{ tang } \beta}{1 - \text{tang}^2 \beta} = \text{tang } 2 \beta \\ (\S. 29.) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{tang } (45^\circ + \beta) - \text{tang } (45^\circ - \beta) &= 2 \text{ tang } 2 \beta \\ \text{и одтуда, увиђавномъ пременомъ, горный образаць} \\ \text{tang } (45^\circ + \beta) &= \text{tang } (45^\circ - \beta) + 2 \text{ tang } 2 \beta \end{aligned}$$

§. 45.

При овомъ рачунаю функція употреблюе се као што смо видели, свакій синусъ за определяванъ слѣдуюћегъ већегъ, и сви они потомъ за налазенъ осталы потребны функція. Лако е дакле увидити, да погрешка, коя бы се случайно учинила при єдномъ одъ нѣхъ, прелази не само на све веће синусе, него и на све посредствомъ овы и нѣга изнаѣене друге функціе; те да е тога ради необходимо нужно, да се при истомъ рачунаю синуса чешће о нѣовой точности уверавамо. У име тога имамо одъ Айлера — *Euler* — слѣдуюћій врло удобанъ образаць

$$\begin{aligned} \sin \beta &= \sin (36^\circ + \beta) - \sin (36^\circ - \beta) + \sin (72^\circ - \beta) - \\ &\quad - \sin (72^\circ + \beta) \end{aligned}$$

Употреблѣнъ овога образца увиђавно е по себи, и састои се у простой замени угла β съ оныма углама, кои синусе у горнѣмъ смислу испытати желимо; добыамо га пакъ слѣдующимъ начиномъ.

По другомъ образцу §. 23. подъ (v., заменяю-
юћи у истомъ угалѣ α еданпутъ съ 36° , другій путъ
пакъ 72° , добыямо збогъ $\cos 36^\circ = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}$, а

$$\cos 72^\circ = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4} \quad (*)$$

$$\sin (36^\circ + \beta) - \sin (36^\circ - \beta) = \sin \beta \frac{1 + \sqrt{5}}{1}, \text{ а}$$

$$\sin (72^\circ + \beta) - \sin (72^\circ - \beta) = \sin \beta \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$$

ова пакъ уравненія еданпутъ сабираюћи, а другій
путъ друго одъ првога одузимаюћи слѣдую

$$\begin{aligned} \sin (36^\circ + \beta) - \sin (36^\circ - \beta) + \sin (72^\circ - \beta) - \\ - \sin (72^\circ + \beta) = \sin \beta, \end{aligned}$$

поменутый образаць.

(*) Да в $\cos 72^\circ = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}$ знамо изъ §. 36.; да в пакъ

$$\begin{aligned} \cos 36^\circ = \frac{1 + \sqrt{5}}{4} \text{ дознаемо айудобнѣ образцемъ } \cos \alpha = \\ = \sqrt{\frac{1 + \cos 2\alpha}{2}} \quad (\S. 27. \text{ подъ 6.}), \text{ поставляюћи у истомъ} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha = 36^\circ, \text{ по чему слѣдую } \cos 36^\circ = \sqrt{\frac{1 + \cos 72^\circ}{2}} \text{ или,} \\ \cos 72^\circ \text{ горньомъ вредности заменяюћи, } \cos 36^\circ = \\ = \sqrt{\frac{1}{2} \left(1 + \frac{-1 + \sqrt{5}}{4} \right)} = \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{3}{2} + \frac{5}{4} \right)} \text{ и наипосле іошъ} \\ \sqrt{\left(\frac{3}{2} + \sqrt{\frac{5}{4}} \right)} \text{ као сурдскій } - \sqrt{(P + \sqrt{Q})} - \text{ разре-} \\ \text{шуюћи, } \cos 36^\circ = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}. \end{aligned}$$

Г.) Построй и употреблѣнѣ тригонометричны
таблица; и преобращанѣ лучне мере у праву
и обратно.

I. Построй и употреблѣнѣ тригономе-
тричны таблица.

§. 46.

Сматранѣмъ веѣе части гониометричны обра-
заца морамо увидити, да се рачунѣ при нѣіовомѣ
употреблѣнѣю, употреблѣнѣмъ логаритама дотичны
функція место нѣіовы броевны вредностѣй, веома
олакшава. Тога ради употребляю се обично не
саме функціе, него нѣіини логаритми, кои су на тай
конацѣ веѣѣ и одавна израчунѣни и у удобне та-
блице сложени. Но будуѣи су, као што знамо, си-
нуси прве четврти за полупречникъ 1, чисти раз-
ломци; значице дакле нѣіовы логаритама одрица-
телне и одтудѣ рачунѣ съ таковымъ логаритмима
неудобанѣ: то су такове таблица обично израчу-
нѣне за полупречникъ 10^{10} , чимъ значице логари-
тама поменуты, у 10 деловны места определѣны
функція постаю положителне.

Найпосле іошѣ валя приметити, да се гонио-
метричне функціе за разлику одѣ нѣіовы логарита-
ма називаю природнымъ, ови пакъ умѣтнымъ или
артистичнымъ функціама. Тако є н. п. по §. 36.
 $\frac{1}{2} = 0.5$ наравный, по овоме пакъ $\log 0.5$ умѣт-
ный синусъ лука одѣ 36° .

§. 47.

Построй и употреблѣнѣ тригонометричны та-
блица учи се наиболѣ изѣ овы самы, зато ѣемо

овде само да наведемо оне гоніометричне истине, на коима су такове таблице основане. Те єсу

1.) Функціє прве четврти расту, кофункціє на противъ умаляваю се увећаваньмъ лука.

2.) Синуси и тангенте врло малы лукова стое съ овима у геометричной, нѣови дакле логаритми съ логаритмима лукова у аритметичной сразмерности, тако да, ако су φ и ψ два врло мала лука, имамо

$$\sin \varphi : \sin \psi = \tan \varphi : \tan \psi = \text{arc } \varphi : \text{arc } \psi, \text{ а}$$

$$\begin{aligned} \log \sin \varphi \div \log \sin \psi &= \log \tan \varphi \div \log \tan \psi = \\ &= \log \text{arc } \varphi \div \log \text{arc } \psi \end{aligned}$$

3.) Разлике већи, међу собомъ найдалѣ єднимъ минутомъ разликуюћи се лукова, имаю се као разлике єдноимены функція, и дакле и као разлике истымъ функціями принадлежећи логаритама. Найпосле

4.) Логаритми тангенте и котангенте исты лукова имаю єднаке, но разнo означене разлике.

Првый одъ овы основа тригонометричны таблица познатъ є іошъ изъ §. 10.; другій слѣдує непосредствено изъ §. 38. и додатка §у. 9. , о третьемъ пакъ и четвертомъ можемо се лако уверити, но найпре морамо іошъ приметити, да другій збогъ $\cos \varphi = \sin (90^\circ - \varphi)$ и $\cot \varphi = \tan (90^\circ - \varphi)$, постои, и за косинусе и котангенте онаковы угла, кои се одъ правога разликую само некимъ броемъ секунда.

§. 48.

Увереніе о третьемъ. За полупречникъ 1 подае се познатимъ изъ геометріе начиномъ, у 10 деловны места

$$\text{arc } 1' = \frac{\pi}{10800} = 0'0002908882, \text{ а по §у 39.}$$

у исто толико теста

$$\sin 30'' = 0'0001454441 ; \text{ дакле}$$

$$2 \sin 30'' = 0'0002908882 = \text{arc } 1',$$

или збогъ $2 \sin 30'' = \text{chord. } 1'$, у 10 деловны места
 $\text{chord. } 1' = \text{arc. } 1'$,

то ће рећи, луци до едного минута могу се за-
 менити тетивкама, или такови се луци могу
 сматрати као праве пруге.

сл. 8.

Ово предпоставши условимо у сл. 8, дае $\text{arc } AM$
 = некомъ брою степена и минута α , $\text{arc. } MP =$
 = $1' = 60''$, наипосле $\text{arc. } MN = v'' < 60''$, и спусти-
 мо MQ , PS и $NR \perp$ на AC ; быт'же $MQ = \sin \alpha$,
 $PS = \sin (\alpha + 60'')$ а $NR = \sin (\alpha + v'')$. Ако пакъ
 іоуць повучемо $Mp \parallel Nn \perp PS$, онда є, сматраюћи
 по горнѣму MP и MN као праве, $\triangle MPp \sim \triangle$
 MNm , и одтуда

$$MP : MN = Pp : Nm, \text{ или}$$

$$(AP - AM) : (AN - AM) = (PS - MQ) : (NR - MQ)$$

т. є.

$$\begin{aligned} [\text{arc } (\alpha + 60'') - \text{arc } \alpha] : [\text{arc } (\alpha + v'') - \text{arc } \alpha] = \\ = [\sin (\alpha + 60'') - \sin \alpha] : [\sin (\alpha + v'') - \sin \alpha] \end{aligned}$$

Луци $(\alpha + 60'')$ и α разликую се међу собомъ
 само еднимъ минутомъ, луци пакъ $(\alpha + v'')$ и α съ

іошъ манѣ; а мы знамо изъ алгебре, да су разли-
ке броева, међу собомъ само єдномъ єдиницомъ
разликуюћи се, у 7 деловны места сразмерне раз-
ликама истымъ броевима принадлежећи логарита-
ма; дакле є

$$\begin{aligned} 1.) \quad & [\text{arc}(\alpha + 60'') - \text{arc} \alpha] : [\text{arc}(\alpha + v'') - \text{arc} \alpha] = \\ & = [\sin(\alpha + 60'') - \sin \alpha] : [\sin(\alpha + v'') - \sin \alpha] \\ & = [\log \sin(\alpha + 60'') - \log \sin \alpha] : \\ & : [\log \sin(\alpha + v'') - \log \sin \alpha] \end{aligned}$$

Подобнымъ начиномъ налазимо и

$$\begin{aligned} 2.) \quad & [\text{arc}(\alpha + 60'') - \text{arc} \alpha] : [\text{arc}(\alpha + v'') - \text{arc} \alpha] = \\ & = [\text{tang}(\alpha + 60'') - \text{tang} \alpha] : \\ & : [\text{tang}(\alpha + v'') - \text{tang} \alpha] \\ & = [\log \text{tang}(\alpha + 60'') - \log \text{tang} \alpha] : \\ & : [\log \text{tang}(\alpha + v'') - \log \text{tang} \alpha] \end{aligned}$$

Овымъ є срасмерностима вопросно треће из-
реченіє, као што є лако увидити, у смотрењу си-
нуса и тангенте доказано; почемъ пакъ косинуси и
котангенте нису ништа друго, него синуси и тан-
генте комплементарны, међу собомъ истымъ начи-
номъ разликуюћи се углава: то постои исто изреченіє
и за косинусе и котангенте, и тако дакле доиста
за све обично употреблююће се функціє.

§. 49.

Уверенъ о четвртомъ. По §. є 16. или 18.

$$\operatorname{tang} \alpha = \frac{1}{\cot \alpha}, \text{ а } \operatorname{tang} (\alpha + d\alpha) = \frac{1}{\cot (\alpha + d\alpha)}$$

т. е. $\operatorname{tang} \alpha \cdot \cot \alpha = 1$, и $\operatorname{tang} (\alpha + d\alpha) \cdot \cot (\alpha + d\alpha) = 1$,
при чему $d\alpha$ означує некій нараштай угла α .

Изъ овы уравненія слѣдує просто

$$\operatorname{tang} \alpha \cdot \cot \alpha = \operatorname{tang} (\alpha + d\alpha) \cdot \cot (\alpha + d\alpha)$$

дакле в

$$\log \operatorname{tang} \alpha + \log \cot \alpha = \log \operatorname{tang} (\alpha + d\alpha) + \log \cot (\alpha + d\alpha) \text{ или, увиѣавномъ пременомъ,}$$

$$\begin{aligned} [\log \operatorname{tang} (\alpha + d\alpha) - \log \operatorname{tang} \alpha] = - \\ - [\log \cot (\alpha + d\alpha) - \log \cot \alpha] \end{aligned}$$

т. е. логаритмичне разлике тангента' и котангента' исты угла, као што є речено, равне, и само раз-
но означене.

§. 50.

На основу прве и друге одъ овы истина (§. 47.) налазимо при рачунаню тригонометричны таблица' логаритме синуса и тангента' лукова до єдногъ ми-
нута, и логаритме косинуса и котангента' лукова одъ $89^\circ 59'$ до 90° , — врло удобно простымъ саби-
ранѣмъ и одузыманѣмъ на слѣдуюћий начинъ:

Посредствомъ точно израчунѣны логаритама просты броева определяемо логаритамъ некогъ синуса, н. п. логаритамъ синуса одъ $30''$, и томе додаемо потомъ логаритмичну разлику броева 30 и 31, чимъ добыямо логаритамъ синуса и тангенте одъ $31''$, а косинуса и котангенте одъ $89^\circ 59' 29''$. Додаюћи потомъ овоме логаритму разлику броева 31 и 32, налазимо логар. синуса и тангенте одъ $32''$ а косинуса и котангенте одъ $89^\circ 59' 28''$; и тымъ

истымъ начиномъ и далѣ поступаючи, подаю се логаритми синуса и тангенте осталь већи лукова до єдногъ минута, а логаритми косинуса и котангенте маньи, до $89^{\circ} 59'$. — Одузимаючи на противъ одъ логаритма синуса одъ $30''$ логаритмичну разлику броева 29 и 30, добыямо логар. синуса и тангенте одъ $29''$, а косинуса и котангенте одъ $89^{\circ} 59' 31''$; одъ овога опеть одузимаючи логаритмичну разлику броева 28 и 29, налазимо логаритамъ синуса и тангенте одъ $28''$, а косинуса и котангенте одъ $89^{\circ} 59' 32''$, и т. д. све друге.

§. 51.

Изъ доказаны сразмерностей §а 48 слѣдую

$$\begin{aligned} 60'' : v'' &= [\log \sin (\alpha + 60'') - \log \sin \alpha] : \\ &: [\log \sin (\alpha + v'') - \log \sin \alpha] \\ &= [\log \tan (\alpha + 60'') - \log \tan \alpha] : \\ &: [\log \tan (\alpha + v'') - \log \tan \alpha] \end{aligned}$$

или, краћине ради прве разлике съ $D \log \sin \alpha$ и $D \log \tan \alpha$, друге пакъ съ $d \log \sin \alpha$ и $d \log \tan \alpha$ означуючи,

$$\begin{aligned} 60'' : v'' &= D \log \sin \alpha : d \log \sin \alpha \\ &= D \log \tan \alpha : d \log \tan \alpha, \text{ и одтуд} \end{aligned}$$

$$d \log \sin \alpha = v'' \cdot \frac{D \log \sin \alpha}{60''},$$

$$d \log \tan \alpha = v'' \cdot \frac{D \log \tan \alpha}{60''}$$

При овоме е, као што лако увиђамо, $\frac{D \log \sin \alpha}{60}$ разлика, којомъ логаритамъ синуса одъ α нарашћуе

при свакомъ вышкѣ одъ єдне секунде до логаритма синуса одъ $(\alpha + 60'')$, т. є. до логаритма синуса єднымъ минутомъ већега лука; а

$\frac{D \log \tan \alpha}{60''}$ иста логаритмична разлика тангенте, и

мы по томе налазимо разлику коіомъ логаритамъ синуса или тангенте одъ α нарашћує до логаритма синуса или тангенте съ v'' већега лука: ако прећашню логаритмичну разлику за $1''$ помложимо съ v .

На основу дакле треће, у §. 48. доказане истине довольно є, да тригонометричне таблице садрже логаритме функція лукова већи одъ $1'$, само одъ минута до минута; єръ се изъ нѣи они други, т. є. логаритми функція, осимъ степена и минута іошъ и некій брой секунда садржаваюћи лукова, лако могу определити — увиђавнымъ изъ горнѣга начиномъ — посредствомъ израчунѣне разлике за $1''$. При томе само іошъ валя приметити, да се съ обзиромъ на прву истину логаритмична поправка збогъ секунда при косинусима и котангентама предходећемъ логаритму нема додати, но одъ нѣга одузети.

§. 52.

Найпосле, на основу четврте, у §. 49. доказане истине, могу быти логаритмичне разлике тангенте и котангенте у таблицама, као заєдничке, само єданпутъ уписане, и таблице дакле тимъ нешто простіє.

§. 53.

При концу овога предмета морамо іошъ показати, коимъ се начиномъ логаритми функція за

полупречникъ 1 преводе у табличне, т. е. у логаритме за полупречникъ 10^{10} , и обратно.

По §. е. 33. $F(\alpha) = r \cdot f(\alpha)$, обратно $f(\alpha) = \frac{F(\alpha)}{r}$; зато

$$\log F(\alpha) = \log f(\alpha) + \log r, \text{ на противъ}$$

$$\log f(\alpha) = \log F(\alpha) - \log r; \text{ или збогъ } r = 10^{10}$$

$$\log F(\alpha) = \log f(\alpha) + 10, \text{ а}$$

$$\log f(\alpha) = \log F(\alpha) - 10; \text{ то ће рећи:}$$

Логаритамъ неке функције налазимо за табличный полупречникъ 10^{10} , ако нѣномъ логаритму за полупречникъ 1, десетъ единица додамо; на противъ пакъ логаритамъ неке функције за полупречникъ 1 добыя се изъ логаритма таблице, ако се одъ овога 10 единица одузму.

II. Преобраћанѣ лучне мере у праву и обратно.

§. 54.

У практики нужно є много пута, да се некій лукъ изрази у частима полупречника, т. е. да се лучна мера преведе у праву; као и обратно некій у частима полупречника, то ће рећи, правомъ меромъ определѣный лукъ, да се изрази нѣговомъ природномъ, т. е. лучномъ меромъ. Извидимо дакле коимъ то начиномъ постизавамо.

У име тога нека намъ представя φ'' некій у секундама израженный лукъ, $\text{arc } \varphi''$ пакъ истога лука дужину у частима пулупречника. За полупречникъ 1 имамо познатимъ изъ геометріе начиномъ

4*



$\varphi'' : 180.60.60 = \text{arc } \varphi'' : \pi$, и отуда

$$\varphi'' = \frac{180.60.60.}{\pi} \cdot \text{arc } \varphi'' \dots \dots \dots (1.)$$

Означуюћи подобно съ ϱ'' лукъ у правой ме-
ри равнъ полупречнику, быће за полупречникъ
1, $\text{arc } \varrho'' = 1$, дакле

$\varrho'' : 180.60.60 = 1 : \pi$, и одатле

$$\varrho'' = \frac{180.60.60.}{\pi} \dots \dots \dots (2.)$$

Почемъ е пакъ найпосле $\text{arc } \varrho'' = 1 = \varrho'' \cdot \text{arc } 1''$,
то е

$$\varrho'' = \frac{1}{\text{arc } 1''} \dots \dots \dots (3.)$$

а збогъ $\text{arc } 1'' = \sin 1''$, јошъ

$$\varrho'' = \frac{1}{\sin 1''} \dots \dots \dots (4.)$$

Поставляюћи садъ све ове вредности у рав-
ность подъ 1, имамо

За преобраћанъ лучне мере у праву

$$\varphi'' = \varrho'' \cdot \text{arc } \varphi'' = \frac{\text{arc } \varphi''}{\text{arc } 1''} = \frac{\text{arc } \varphi''}{\sin 1''} \text{ и одту-}$$

да обратно

За преобраћанъ праве мере у лучну

$$\text{arc } \varphi'' = \frac{\varphi''}{\varrho''} = \varphi'' \cdot \text{arc } 1'' = \varphi'' \sin 1'' ;$$

при чему е, по равности подъ 2, у секундама из-
раженный полупречникъ

$$\varrho'' = 206265''$$

Додатакъ. Сасвимъ истымъ начиномъ нала-
зимо $\varrho' = \frac{1}{\text{arc } 1'} = \frac{1}{\sin 1'}$, $\varrho^0 = \frac{1}{\text{arc } 1^0}$; и дакле

$$\varphi' = \varrho' \text{ arc } \varphi' = \frac{\text{arc } \varphi'}{\text{arc } 1'} = \frac{\text{arc } \varphi'}{\sin 1'}, \text{ а}$$

$$\varphi^0 = \varrho^0 \cdot \text{arc } \varphi^0 = \frac{\text{arc } \varphi^0}{\text{arc } 1^0}$$

при чему є

$$\varrho' = \frac{180.60}{\pi} \doteq 3447'8, \text{ а}$$

$$\varrho^0 = \frac{180}{\pi} \doteq 57'3$$

§. 55.

Ако φ'' нїе веће одъ $2400'' = 40'$, онда $\text{arc } \varphi''$ у првомъ одъ горњи израза можемо замєнити синусомъ, т. є. можемо рећи, да є

$$\varphi'' = \frac{\sin \varphi}{\sin 1''}, \text{ и одтуда обратно}$$

$$\sin \varphi = \varphi'' \cdot \sin 1''$$

Узимаюћи у првомъ одъ ова два израза $\varphi = 40'$, грєшимо само съ $0'05''$; при φ пакъ $= 1^0$, грєшимо съ $0'18''$.

Ова два израза служе, као што се лако уви-
ђа, првый за налазенї малогъ некогъ лука изъ по-
знатогъ нїговогогъ синуса и синуса $1''$, другїй пакъ
обратно за налазенї синуса некогъ малогъ лука
изъ овога и синуса $1''$.

КНЬИГА ДРУГА.

РАВНА ТРИГОНОМЕТРИЯ.

Б.) Разрешеніе триуглова.

I. Обшта свойства триуглова.

§. 56.

сл. 9. Означимо угле произвольного триугла ABC (сл. 9.) са A , B и C , а супротне нѣма стране дотично съ a , b и c ; и спустимо потомъ съ ма коєга угла, н. п. съ B , управну BD на супротну страну b . Сматраюћи потомъ страну c као полупречникъ мере угла A , а страну a као полупречникъ угла C : у правна є BD синусъ $\angle A$ и C , т. є. $BD = \sin_c A = \sin_a C$.

По §у є пакъ 33. за полупречникъ 1

$\sin_c A = c. \sin A$, а $\sin_a C = a. \sin C$; дакле є

$c. \sin A = a. \sin C$, н одтуда

$$a : c = \sin A : \sin C$$

Истимъ начиномъ добыємо

$$a : b = \sin A : \sin B$$

$$b : c = \sin B : \sin C$$

..... (1.

одкуда види се, да су стране свакогъ триугла сразмерне синусима супротны угла.

§. 57.

Изъ предходећи сразмерностей слѣдуе:

$$(a + c) : (a - c) = (\sin A + \sin C) : (\sin A - \sin C)$$

$$(a + b) : (a - b) = (\sin A + \sin B) : (\sin A - \sin B)$$

$$(b + c) : (b - c) = (\sin B + \sin C) : (\sin B - \sin C)$$

т. е.

$$\frac{a + c}{a - c} = \frac{\sin A + \sin C}{\sin A - \sin C}, \quad \frac{a + b}{a - b} = \frac{\sin A + \sin B}{\sin A - \sin B},$$

$$\frac{b + c}{b - c} = \frac{\sin B + \sin C}{\sin B - \sin C};$$

будући е пакъ по §. 25. $\frac{\sin \varphi + \sin \psi}{\sin \varphi - \sin \psi} =$

$$= \frac{\tan \frac{1}{2} (\varphi + \psi)}{\tan \frac{1}{2} (\varphi - \psi)} : \text{то е}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{a + c}{a - c} &= \frac{\tan \frac{1}{2} (A + C)}{\tan \frac{1}{2} (A - C)} \\ \frac{a + b}{a - b} &= \frac{\tan \frac{1}{2} (A + B)}{\tan \frac{1}{2} (A - B)} \\ \frac{b + c}{b - c} &= \frac{\tan \frac{1}{2} (B + C)}{\tan \frac{1}{2} (B - C)} \end{aligned} \right\} \dots \dots (2.)$$

и дакле уобште:

Количникъ одъ сбира две стране и нѣове разлике, раванъ е количнику тангенте полусбира, поделѣне тангентомъ полуразлике истымъ странама супротны угла.

§. 58.

сл. 9.

Изъ слике 9. подае се далъ за полупречникъ 1, $AD = c. \cos A$, $DC = a. \cos C$, дакле

$$b = AD + DC = c. \cos A + a. \cos C.$$

Подобнымъ сматранѣмъ налазимо и

$$a = b. \cos C + c. \cos B$$

$$c = b. \cos A + a. \cos B$$

Мложеѣи прву равеность съ b , другу съ a а трећу съ c добыямо

$$b^2 = bc. \cos A + ab. \cos C$$

$$a^2 = ab. \cos C + ac. \cos B \quad \text{и}$$

$$c^2 = bc. \cos A + ac. \cos B ;$$

оузимаюѣи пакъ одъ сбира сваке две одъ овы равеностѣй дотичну трећу, слѣдуе

$$a^2 + b^2 - c^2 = 2ab. \cos C,$$

$$a^2 + c^2 - b^2 = 2ac. \cos B$$

$$b^2 + c^2 - a^2 = 2bc. \cos A ; \text{ и одтуда}$$

$$\left. \begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab. \cos C \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac. \cos B \\ a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc. \cos A \end{aligned} \right\} \dots (3).$$

то ѣе реѣи:

Квадратъ сваке стране раванъ е сбиру квадрата друге две стране, умалѣномъ удвоеннымъ произведениемъ исты страна и косинуса вопросной страни супротнога угла.

§. 59.

Изъ горњи равеностѣй слѣдую за косинусе угла слѣдуюѣе три

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

Да бы ове изразе, ради касніе потребе, успосobili за логаритмичанъ рачунъ, то поставимо у образцу $\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1$ (§. 26. подъ 5) редомъ $2a = C, B$ и A , дакле односно $a = \frac{C}{2}, \frac{B}{2}$ и $\frac{A}{2}$.

Имат' њемо

$$\cos C = 2 \cos^2 \frac{C}{2} - 1$$

$$\cos B = 2 \cos^2 \frac{B}{2} - 1$$

$$\cos A = 2 \cos^2 \frac{A}{2} - 1$$

Заменяюћи садъ косинусе у горњимъ равенствима съ овима вредностима слѣдуе

$$\begin{aligned} 2 \cos^2 \frac{C}{2} &= \frac{2ab + a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{(a + b)^2 - c^2}{2ab} \\ &= \frac{(a + b + c)(a + b - c)}{2ab} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \cos^2 \frac{B}{2} &= \frac{2ac + a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{(a + c)^2 - b^2}{2ac} = \\ &= \frac{(a + b + c)(a + c - b)}{2ac} \end{aligned}$$

$$2 \cos^2 \frac{A}{2} = \frac{2bc + b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{(b+c)^2 - a^2}{2bc} \\ = \frac{(a+b+c)(b+c-a)}{2bc}; \text{ или кра-}$$

ћине ради $a + b + c = 2S$, дакле $a + b - c = 2(S - c)$, $a + c - b = 2(S - b)$, а $b + c - a = 2(S - a)$ постављајући,

$$\cos^2 \frac{C}{2} = \frac{S(S-c)}{ab}$$

$$\cos^2 \frac{B}{2} = \frac{S(S-b)}{ac}$$

$$\cos^2 \frac{A}{2} = \frac{S(S-a)}{bc}, \text{ и одтуда}$$

$$\left. \begin{aligned} \cos \frac{C}{2} &= \sqrt{\frac{S(S-c)}{ab}} \\ \cos \frac{B}{2} &= \sqrt{\frac{S(S-b)}{ac}} \\ \cos \frac{A}{2} &= \sqrt{\frac{S(S-a)}{bc}} \end{aligned} \right\} \dots (4.)$$

§. 60.

Овакимъ истимъ начиномъ доб्याмо изъ образа $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$ (§. 26).

$$\left. \begin{aligned} \sin \frac{A}{2} &= \sqrt{\frac{(S-b)(S-c)}{bc}} \\ \sin \frac{B}{2} &= \sqrt{\frac{(S-a)(S-c)}{ac}} \\ \sin \frac{C}{2} &= \sqrt{\frac{(S-a)(S-b)}{ab}} \end{aligned} \right\} \dots (5.)$$

Ове пакъ изразе съ предходећима дотично делећи налазимо

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{tang} \frac{A}{2} &= \sqrt{\frac{(S-b)(S-c)}{S(S-a)}} \\ \operatorname{tang} \frac{B}{2} &= \sqrt{\frac{(S-a)(S-c)}{S(S-b)}} \\ \operatorname{tang} \frac{C}{2} &= \sqrt{\frac{(S-a)(S-b)}{S(S-c)}} \end{aligned} \right\} \dots (6.)$$

Заменяюћи наипосле у обраацу $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ (§. 26. подъ 1.) 2α редомъ съ A , B и C , а по томъ синусе и косинусе полууглова съ нѣовимъ горњимъ вредностима, находимо

$$\left. \begin{aligned} \sin A &= \frac{2}{bc} \sqrt{S(S-a)(S-b)(S-c)} \\ \sin B &= \frac{2}{ac} \sqrt{S(S-a)(S-b)(S-c)} \\ \sin C &= \frac{2}{ab} \sqrt{S(S-a)(S-b)(S-c)} \end{aligned} \right\} \dots (7.)$$

II. Разрешенѣ правоуглогъ триугла

а.) у ОБИЧНЫМЪ СЛУЧАЄВИМА.

§. 61.

Правоуглый триугаль определенъ е, као што знамо, ако су осимъ правога угла іошъ два нѣгова основка позната, кои само несмеду быти оба угли.

Познати дакле основци могу само бити :

1.) пречница и една управница; 2.) пречница и еданъ угаль; 3.) обе управнице; 4.) една управница и на нѡй лежећій угаль; 5.) една управница и супротный угаль, и мы по томе при разрешеніи правоуглогъ триугла можемо имати свега само петъ разны случаєва.

Неупуштаюћи се у особито сматранъ свакогъ поединогъ случая, испытатѣмо само одношенъ страна и угла правоуглогъ триугла уобште, изъ чега податъ ће се потомъ и исто нѣгово разрешеніе.

§. 62.

сл. 10.

По §. 56. има се у сл. 10.

$$1.) c : a = \sin 90^\circ : \sin A = 1 : \sin A$$

$$2.) c : b = \sin 90^\circ : \sin B = 1 : \sin B$$

$$3.) a : b = \sin A : \sin B;$$

Будући е пакъ $\sin A = \sin (90 - B) = \cos B$, и обратно $\sin B = \sin (90^\circ - A) = \cos A$, то имамо јошъ

$$4.) c : a = 1 : \cos B$$

$$5.) c : b = 1 : \cos A$$

$$6.) a : b = \sin A : \cos A = \cos B : \sin B$$

Изъ прве и четврте сразмерности слѣдує

$$I. \quad a = c. \sin A = c. \cos B.$$

Изъ 2 пакъ и 5.

$$II. \quad b = c. \sin B = c. \cos A.$$

наипосле изъ 6.

$$\text{III.} \quad a = b. \operatorname{tang} A = b. \cot B, \text{ обратно}$$

$$\text{IV.} \quad b = a. \operatorname{tang} B = a. \cot A$$

По првой е дакле и другой равности свака управница равна производу пречнице са синусомъ управници супротногъ, или косинусомъ на истой лежещегъ угла, по трећой пакъ и четвертой равности свака управница равна производу оне друге управнице са тангентомъ првой супротногъ, или котангентомъ на истой лежещегъ угла.

§. 63.

Помоћу ова два правила и већъ познатогъ трећегъ $c^2 = a^2 + b^2$ у станю смо разрешити правоуглы триугалъ у свакомъ одъ поменути случаевъ. Но будући ово последнѣ уравненіе за употреблѣнѣ логаритама ніе способно, то ћемо сада јошъ показати, како се и оно врло лако зато уде-сити може.

Изъ истогъ уравненія слѣдуе

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = a \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}}$$

Будући пакъ тангента, као што смо видели, (§. 10.), може имати сваку вредность одъ 0 до ∞ , то можемо у овомъ изразу поставити $\frac{b}{a} = \operatorname{tang} \varphi$; быт' ће потомъ

$$c = a \sqrt{1 + \operatorname{tang}^2 \varphi} = a. \sec \varphi = \frac{a}{\cos \varphi}$$

и одтудъ јошъ

$$a = c. \cos \varphi.$$

У случаю дакле, гди бы вопросно уравненіе потребно было, изнаћи ће се найпре изъ израза

$\text{tang } \varphi = \frac{b}{a}$, дакле $\log \text{tang } \varphi = \log b - \log a$,
 помоћный $\angle \varphi$, а съ овимъ потомъ изъ $c = \frac{a}{\cos \varphi}$
 пречница c , или изъ $a = c \cdot \cos \varphi$ управница a .

§. 64.

За површный садржай T правоуглогъ триугла ABC , добыямо изъ уравненія §. 62. подъ I, II, III редомъ

$$T = \frac{1}{2} bc \cdot \sin A = \frac{1}{2} bc \cos B = \frac{1}{2} ac \cdot \sin B = \frac{1}{2} ac \cdot \cos A \dots\dots\dots (1)$$

$$= \frac{1}{2} b^2 \cdot \text{tang } A = \frac{1}{2} b^2 \cdot \cot B = \frac{1}{2} a^2 \cdot \text{tang } B = \frac{1}{2} a^2 \cdot \cot A \dots\dots\dots (2)$$

по уравненію пакъ $c^2 = a^2 + b^2$ збогъ $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{(c+a)(c-a)}$ и $a = \sqrt{c^2 - b^2} = \sqrt{(c+b)(c-b)}$ слѣдуе

$$T = \frac{a}{2} \sqrt{(c+a)(c-a)} = \frac{b}{2} \sqrt{(c+b)(c-b)} \dots (3)$$

Ови су изрази, као што се види, сви удесни за рачунъ съ логаритмима, и по нѣма е површный садржай правоуглогъ триугла раванъ половини производа изъ пречнице и едне управнице са синусомъ на управници лежећегъ, или косинусомъ истой супротногъ угла (1); или раванъ половини производа изъ квадрата едне управнице и тангенте на нѣой лежећегъ, или котангенте супротногъ іой угла (2); или най-после раванъ половини производа едне управнице са квадратнымъ кореномъ изъ производа сбира и разлике пречнице и исте управнице (3).

§. 65.

Сватаюћи сва ова докучења, удобности ради при употреблѣню, у єдну таблицу, имамо

Познати основци	Непознати основци триугла и нѣговъ површный садржай
1.) пречница c и управница a	$\left\{ \begin{aligned} b &= \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{(c+a)(c-a)}; \\ \sin A &= \frac{a}{c}; T = \frac{a}{2} \sqrt{(c+a)(c-a)} \end{aligned} \right.$
2.) пречница c и єданъ угаль A .	$\left\{ \begin{aligned} a &= c. \sin A; b = c. \cos A; \\ T &= \frac{c^2}{2} \sin A \cos A \text{ (найудобнїе)} \end{aligned} \right.$
3.) обе управнице a и b	$\left\{ \begin{aligned} c &= \sqrt{c^2 + b^2}; \tan A = \frac{a}{b}; \\ T &= \frac{1}{2} ab \end{aligned} \right.$
4.) єдна управница b и на нѣой лежећій угаль A	$\left\{ \begin{aligned} c &= \frac{b}{\cos A}; a = b. \tan A; \\ T &= \frac{b^2}{2} \tan A \end{aligned} \right.$
5.) єдна управница a и супротный A	$\left\{ \begin{aligned} c &= \frac{a}{\sin A}; b = a. \cot A; \\ T &= \frac{a^2}{2} \cot A \end{aligned} \right.$
	Приметба. У свима є случаєвима $\gamma B = 90^\circ - A$

6.) У НЕКИМЪ ОСОБИТЫМЪ СЛУЧАЄВИМА.

§. 66.

При разрешенію правоугологъ триугла догаѣ се, да є место єдногъ одъ нужна два основка познатъ сбиръ или разлика друга два, или место оба она да су задата два сбира или две разлике, или єданъ сбиръ и єдна разлика основака. Разрешенѣ у таковымъ случаєвима показат' ѣмо у слѣдующимъ §§а, ограничаваюѣи се при томъ само на найтеже.

§. 68.

1.) Познатъ є сбиръ пречнице c и веѣе управнице a , $c + a = S$, или ѣина разлика $c - a = D$ и она друга управница b .

У првомъ случаю разрешавамо правоуглыи триугалъ слѣдующимъ образцима

$$\cot B = \frac{(S + b)(S - b)}{2 Sb} \dots\dots\dots (1)$$

$$a = \frac{(S + b)(S - b)}{2 S} \dots\dots\dots (2)$$

$$c = \frac{b}{\sin B} \dots\dots\dots (3)$$

$$T = \frac{b (S + b)(S - b)}{4 S} \dots\dots\dots (4)$$

Првый, и у овомъ случаю, основной образацъ находимо слѣдующимъ начиномъ:

$$c = \frac{b}{\sin B} = b \cdot \operatorname{cosec} B = b \sqrt{1 + \cot^2 B}$$

$a = b \cdot \cot B$; дакле

$$c + a = S = b [\sqrt{1 + \cot^2 B} + \cot B],$$

или, ово уравненіе у смотреню $\cot B$ разрешаваюћи, вопросный изразъ подъ 1.

Другій подае се изъ $a = b \cdot \cot B$, поставляюћи место $\cot B$ наѣну нѣну вредность; а 4. изъ $T = \frac{1}{2} ab$ узимаюћи наѣну у 2. вредность одъ a .

За другій случай налазимо сасвимъ истымъ начиномъ

$$1.) \quad \cot B = \frac{(b + D)(b - D)}{2Db}$$

$$2.) \quad a = \frac{(b + D)(b - D)}{2D}$$

$$3.) \quad c = \frac{b}{\sin B}$$

$$4.) \quad T = \frac{b(b + D)(b - D)}{4D}$$

§. 68.

2.) Задать в сбиръ $a + b = s$, или разлика $a - b = d$ обадве управнище и пречница c .

У првомъ случаю имамо

$$\cos \frac{A - B}{2} = \frac{s}{c \sqrt{2}} \quad \text{или}$$

$$\cos (A - B) = \frac{(s + c)(s - c)}{c^2}$$

чимъ налазимо разлику угла A и B , а помоћу нѣ и сбира $A + B = 90^\circ$, свакій поединый угаль. Оста-

ли непознати основци и садржай триугла определю се потомъ помоћу нађены угла.

До наведена два образа долазимо слѣдующимъ путемъ.

$$a = c \cdot \sin A, b = c \cdot \sin B;$$

дакле $a + b = s = c (\sin A + \sin B)$ одкуда слѣдуе

$$\sin A + \sin B = \frac{s}{c}.$$

Но по §. 23.

$$\begin{aligned} \sin A + \sin B &= 2 \cdot \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} = \\ &= 2 \cdot \sin 45^\circ \cos \frac{A-B}{2} = \sqrt{2} \cdot \cos \frac{A-B}{2}, \end{aligned}$$

(еръ е по §. 36. $\sin 45^\circ = \frac{1}{2} \sqrt{2}$) слѣдовательно

$$\sqrt{2} \cdot \cos \frac{A-B}{2} = \frac{s}{c}, \quad \text{а}$$

$$\cos \frac{A-B}{2} = \frac{s}{c \sqrt{2}}.$$

Онай другій изразъ добыямо изъ овога по образцу $\cos \frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{1}{2} (1 + \cos \beta)}$, (у §. 29. подъ 11.) поставляюћи у истомъ $\beta = A - B$, чимъ слѣдуе

$$\cos \frac{A-B}{2} = \sqrt{\frac{1}{2} [1 + \cos (A-B)]} \quad \text{а по предходеһой равенности}$$

$$\sqrt{\frac{1}{2} [1 + \cos (A-B)]} = \frac{s}{c \sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{2} [1 + \cos (A-B)] = \frac{s^2}{2c^2}, \quad \text{и одтуда}$$

$$\cos (A-B) = \frac{s^2 - c^2}{c^2} = \frac{(s+c)(s-c)}{c^2}$$

У другомъ случаю овога задатка имамо

$$\sin \frac{A-B}{2} = \frac{d}{c \sqrt{2}} \quad \text{или}$$

$\cos (A-B) = \frac{(c+d)(c-d)}{c^2}$, коє изразе добья-
мо такођеръ вишеназначенымъ путемъ.

§. 69.

3.) Задать е сбиръ или разлика пречни-
це и едне управнице $c + a = S$, или $c - a = D$, и
еданъ угаль н. пр. A .

За првый случай имамо найпре пречницу

$$c = \frac{S}{2 \sin^2 (45^\circ + \frac{A}{2})} = \frac{S}{2 \cos^2 (45^\circ - \frac{A}{2})},$$

коіомъ после помоћу познатогъ угла определяемо
остале основке и садржай.

За другій случай имамо

$$c = \frac{D}{2 \sin^2 (45^\circ - \frac{A}{2})} = \frac{D}{2 \cos^2 (45^\circ + \frac{A}{2})}$$

Ови образци добьяю се слѣдуюћимъ начи-
номъ :

$$a = c \sin A, \quad \text{дакле}$$

$$c + a = S = c (1 + \sin A)$$

$$c - a = D = c (1 - \sin A),$$

а одтуда

$$\left. \begin{aligned} c &= \frac{S}{1 + \sin A} \\ c &= \frac{D}{1 - \sin A} \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (\alpha)$$

Поставляюћи у образцу §. 23.

$$\sin \varphi + \sin \psi = 2 \sin \frac{\varphi + \psi}{2} \cos \frac{\varphi - \psi}{2}, \quad \text{и}$$

$$\sin \varphi - \sin \psi = 2 \cos \frac{\varphi + \psi}{2} \sin \frac{\varphi - \psi}{2},$$

угалъ $\varphi = 90^\circ$, а $\psi = A$, слѣдує

$$\sin 90^\circ + \sin A, \quad \text{т. е.}$$

$$1 + \sin A = 2 \sin \left(45^\circ + \frac{A}{2}\right) \cos \left(45^\circ - \frac{A}{2}\right)$$

$$1 - \sin A = 2 \cos \left(45^\circ + \frac{A}{2}\right) \sin \left(45^\circ - \frac{A}{2}\right);$$

будући є пакъ $\left(45^\circ - \frac{A}{2}\right)$ комплементъ одъ $\left(45^\circ + \frac{A}{2}\right)$

и обратно, т. е. будући є $\left(45^\circ + \frac{A}{2}\right) + \left(45^\circ - \frac{A}{2}\right) = 90^\circ$:

то є $\cos \left(45^\circ - \frac{A}{2}\right) = \sin \left(45^\circ + \frac{A}{2}\right)$, и обратно

$$\cos \left(45^\circ + \frac{A}{2}\right) = \sin \left(45^\circ - \frac{A}{2}\right), \quad \text{— и збогъ тога}$$

$$1 + \sin A = 2 \sin^2 \left(45^\circ + \frac{A}{2}\right) = 2 \cos^2 \left(45^\circ - \frac{A}{2}\right)$$

$$1 - \sin A = 2 \cos^2 \left(45^\circ + \frac{A}{2}\right) = 2 \sin^2 \left(45^\circ - \frac{A}{2}\right)$$

коє вредности, у уравненія подъ α поставлѣне, даю наведена два израза пречнице c .

§. 70.

4. Познать є обадве управниці сбиръ $a + b = s$, или нѣина разлика $a - b = d$, и єданъ угаль, н.п. A .

За првый случай имамо

$$c = \frac{s}{\cos \frac{A-B}{2} \cdot \sqrt{2}}, \quad \text{а за другій}$$

$$c = \frac{d}{\sin \frac{A-B}{2} \cdot \sqrt{2}};$$

съ пречиномъ пакъ c и познатымъ угломъ A определяемо све остале основке.

Ове образце налазимо слѣдующимъ начиномъ. По §у є 62.

$$a = c \cdot \sin A, \quad b = c \cdot \sin B, \quad \text{дакле}$$

$$s = a + b = c \cdot (\sin A + \sin B), \quad \text{а}$$

$$d = a - b = c \cdot (\sin A - \sin B), \quad \text{и одатле}$$

$$c = \frac{s}{\sin A + \sin B} = \frac{d}{\sin A - \sin B},$$

или обзиромъ на §. 68.

$$c = \frac{s}{\cos \frac{A-B}{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{d}{\sin \frac{A-B}{2} \cdot \sqrt{2}}$$

III. Разрешенъ косоуглогъ триугла.

а.) у найобичнимъ случаєвима.

§. 71.

Косоуглый триугаль подпуно определенъ є, као што знамо,

- 1.) Чрезъ све три нѣгове стране,
- 2.) две стране и заключеный угаль,
- 3.) две стране и веѣой супротный угаль, и
- 4.) едномъ страномъ и оба на нѣой лежеѣа угла.

Извидимо дакле, како се таковый триугаль разрешава у свакомъ одъ овы случаѣва по на особѣ, означуюћи при томъ еданпутъ за свагда стране триугла, као у §у 56. съ a , b и c , угле съ A , B и C , а садржай съ T .

- 1.) Познате су све три стране a , b и c ; траже се дакле угли A , B и C и површний садржай T .

§. 72.

Непознате угле налазимо у овомъ случаю най-удобнѣе посредствомъ образаца §. 60. подъ 5,

$$\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(S-b)(S-c)}{bc}},$$

$$\sin \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(S-a)(S-c)}{ac}},$$

$$\sin \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{(S-a)(S-b)}{ab}};$$

при чему морамо приметити, да бы довольно было изнаћи овимъ начиномъ само два угла, н. п. A и B , ерѣ є съ нѣима, збогъ $A + B + C = 180^\circ$, дакле $C = 180^\circ - (A + B)$, познать и трећій; но боль є определить и овай поменутомъ, одъ она два угла сасвимъ независнымъ начиномъ. У обште валя одъ яко не само при разрешеню триуглова, него и при другимъ задатцима наблюдавати то начело: да

непознате основке, гди годъ се може, неопреде-
люемо єданъ посредствомъ веѣъ изнаѣеногъ дру-
гогъ, но свагда само помоћу задаты, да не бы се
погрешка при єдномъ одъ нѣи учинѣна, пренела и
на оне друге.

О точности овако определѣны углова увера-
вамо се нѣювымъ сабиранѣмъ, по чему, ако су до-
бро изнаѣени, нѣювъ сбиръ мора быти раванъ 180° .

Површный садржай наипосле добыямо позна-
тымъ изъ геометріе образцемъ

$$T = \sqrt{S(S-a)(S-b)(S-c)},$$

при комъ є S као и у горњимъ образцима =
= $\frac{1}{2}(a+b+c)$.

§. 73.

Примера ради нека є у вопросномъ случаю

$$\left. \begin{array}{l} a = 42 \\ b = 38 \\ c = 24 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{дакле } S = \frac{1}{2}(42 + 38 + 24) = \frac{1}{2} 104 = 52 \\ S-a=52=42+10, \quad S-b=52-38=14, \quad a \\ S-c=52-24=28. \end{array}$$

По горњему є

$$1.) \sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{14 \times 28}{38 \times 24}} = \frac{7}{\sqrt{114}}$$

$$\log \sin \frac{A}{2} = 0.845098 \dots \dots \dots \log 7$$

$$- 1.028453 \dots \dots \dots \frac{1}{2} \log 114$$

$$0.816645 - 1, \text{ или за полупречникъ}$$

таблица (по §. 53.)

$$\log \sin \frac{A}{2} = 9.816645, \\ -507 \\ \hline 138 : 2.43 = 57,$$

и тако

$$\frac{A}{2} = 40^\circ 57' 57'', \text{ а}$$

$$\angle A = 81^\circ 55' 54''$$

$$2.) \sin \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{10 \times 28}{42 \times 24}} = \sqrt{\frac{5}{18}}, \text{ дакле}$$

$$\log \sin \frac{B}{2} = 0.349485 \dots \dots \dots \frac{1}{2} \log 5 \\ - 0.627636 \dots \dots \dots \frac{1}{2} \log 18 \\ \hline 0.721849 - 1, \text{ или за полупреч-}$$

никъ 10^{10}

$$\log \sin \frac{B}{2} = 9.721849, \\ -774 \\ \hline 75 : 3.4 = 22$$

одтудъ

$$\frac{B}{2} = 31^\circ 48' 22'', \text{ а}$$

$$\angle B = 63^\circ 36' 44''$$

$$3.) \sin \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{10 \times 14}{42 \times 38}} = \sqrt{\frac{5}{57}}, \text{ дакле}$$

$$\log \sin \frac{C}{2} = 0.349485 \dots \dots \dots \frac{1}{2} \log 5 \\ - 0.877937 \dots \dots \dots \frac{1}{2} \log 57 \\ \hline 0.471548 - 1, \text{ или за табличный}$$

полупречникъ

$$\log \sin \frac{C}{2} = 9.471548$$

$$-271$$

$$\frac{277}{679} = 41$$

и одтуда

$$\frac{C}{2} = 17^{\circ} 13' 41'', \text{ а}$$

$$\angle C = 34^{\circ} 27' 22''$$

Найпосле

$$4.) T = \sqrt{52.10.14.28}$$

$$\log T = \frac{1}{2} \left\{ \begin{array}{l} 1.716003 \\ 1.000000 \\ 1.146128 \\ 1.447158 \\ \hline 5.309289 \end{array} \right\} = 2.654644$$

$$- \frac{562}{820 : 96 = 8}$$

и по томе $T = 451.48$

Уверавајући се о тачности угла налазимо као што треба

$$A + B + C = \left\{ \begin{array}{l} 81^{\circ} 55' 54'' \\ 63^{\circ} 36' 44'' \\ 34^{\circ} 27' 22'' \\ \hline 180^{\circ} 0' 0'' \end{array} \right.$$

2.) Познате су две стране a и b са закљученимъ угломъ C ; тражи се дакле трећа страна c , угли A и B и садржай T .

§. 74.

Овде определяемо найпре A и B слѣдуюћимъ начиномъ : по §. 57. подъ 2.

$$\frac{\operatorname{tang} \frac{1}{2}(A+B)}{\operatorname{tang} \frac{1}{2}(A-B)} = \frac{a+b}{a-b}, \text{ дакле}$$

$$\operatorname{tang} \frac{1}{2}(A-B) = \frac{a-b}{a+b} \operatorname{tang} \frac{1}{2}(A+B)$$

Овомъ равености добыямо $(A-B)$, ерь є $\frac{1}{2}(A+B) = \frac{1}{2}(180^\circ - C) = \frac{s}{2}$ познато; имаюћи пакъ

$(A+B) = s$ и $(A-B) = d$, добыямо саби-
ранѣмъ

$$\angle A = \frac{1}{2}(s+d), \text{ а одузимаемъ}$$

$$\angle B = \frac{1}{2}(s-d)$$

При овомъ треба іошъ приметити, да у случаю: гди бы была страна $b > a$, дакле и $\angle B > A$, у горнѣмъ уравненію B и b на прво место дотичны израза поставити валя; у томъ сирѣчь случаю имамо разрешити уравненіе

$$\operatorname{tang} \frac{1}{2}(B-A) = \frac{b-a}{b+a} \operatorname{tang} \frac{1}{2}(B+A)$$

§. 75.

Трећу страну c налазимо найпоузданіе првымъ образцемъ §. 58. подъ 3., по комъ є

$c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C}$; но найпре морамо овай изразъ удесити за употреблѣнѣ логаритама. У име тога додаймо подкореной количини и одузимамо одъ исте $2ab$; бытѣе

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab - 2ab - 2ab \cdot \cos C}$$

$$= \sqrt{(a-b)^2 + 2ab(1 - \cos C)}$$

$$= (a-b) \sqrt{1 + \frac{2ab(1 - \cos C)}{(a-b)^2}},$$

или збогъ $1 - \cos C = 2 \sin^2 \frac{C}{2}$ (§. 29. подъ 11.)

$$c = (a-b) \sqrt{1 + \frac{4ab \sin^2 \frac{1}{2} C}{(a-b)^2}},$$

наипосле пакъ іошъ разломакъ

$$\frac{4ab \sin^2 \frac{1}{2} C}{(a-b)^2} = \tan^2 \varphi \dots \dots \dots (\alpha)$$

поставляюћи,

$$c = (a-b) \sqrt{1 + \tan^2 \varphi} = (a-b) \sec \varphi$$

$$= \frac{a-b}{\cos \varphi} \dots \dots \dots (\beta)$$

Вопросу дакле страну c наѣиѣмо, ако най-пре изъ уравненія подъ α определимо помоћный угаль φ , и нѣгову вредность потомъ поставимо у уравненіе подъ β .

§. 76.

Сматраюћи єдну одъ задаты страна, н. п. a као основицу триугла (сл. 9.), нѣговъ є садржай сл. 9.
 $T = \frac{1}{2} ah$, означуюћи съ h нѣгову висину. Но иста є висина

$$h = \sin_b C = b \sin C \quad (\S 33.),$$

дакле садржай

$$T = \frac{1}{2} ab \sin C$$

то ће рећи: садржај триугла равнањ е полови-
ни производа две стране са синусомъ заключе-
ногъ угла.

§. 77.

За веће обяснѣнѣ горнѣга узмимо, да е као
у пређашнѣмъ случаю $a = 42$, $b = 38$, заключеный
 $\angle C = 34^\circ 27' 18''$; бытѣ

$$1.) \quad A + B = s = 180^\circ - C = 145^\circ 32' 42'',$$

$$\frac{1}{2}(A+B) = \frac{s}{2} = 72^\circ 46' 21'', \text{ и дакле}$$

$$\operatorname{tang} \frac{1}{2}(A-B) = \frac{4}{80} \operatorname{tang} \frac{1}{2}(A+B) = \frac{1}{20} \operatorname{tang} 72^\circ 46' 31''$$

$$\left. \begin{array}{l} \log \operatorname{tang} \frac{1}{2}(A-B) = 10.508373 \\ \quad + 141 \\ \hline 10.508514 \\ - 1.301030 \dots \dots \log 20 \\ \hline 9.207484 \\ - 7013 \\ \hline 471 : 13 \cdot 4 = 35 \end{array} \right\} \dots \dots \log \operatorname{tang} \frac{1}{2}(A+B)$$

одтуда $\frac{1}{2}(A-B) = 9^\circ 9' 35''$, дакле

$$A - B = 18^\circ 19' 10''$$

Горе имамо $A + B = 145^\circ 32' 42''$, одтуда
(ове две равености са- $2A = 163^\circ 51' 52''$
бираюћи и одузимаюћи), $2B = 127^\circ 13' 30''$, и дакле
 $\angle A = 81^\circ 55' 56''$
 $\angle B = 63^\circ 46' 46''$;

свакій као што видимо съ 2'' већій него у првомъ
случаю, кое е, радећи у 6 само деловны места,
врло незнатна погрешка.

2.) У име стране c имамо најпре

$$\operatorname{tang}^2 \varphi = \frac{4ab \cdot \sin^2 \frac{1}{2} C}{(a-b)^2}, \text{ дакле}$$

$$\log \operatorname{tang} \varphi = \log 2 + \log \sin \frac{C}{2} - \log (a-b) + \\ + \frac{1}{2} (\log a + \log b)$$

$$\begin{array}{r} = 0.301030 \dots \dots \dots \log 2 \\ \quad \left. \begin{array}{l} 9.471271 \\ 278 \end{array} \right\} \dots \dots \dots \log \sin \frac{C}{2} \\ 0.811624 \dots \dots \dots \frac{1}{2} \log a \\ 0.789892 \dots \dots \dots \frac{1}{2} \log b \\ \hline 11.374095 \\ -0.602060 \dots \dots \dots \log (a-b) \\ \hline 10.772035 \\ -1760 \\ \hline 275 : 12' 8 = 21, \text{ а} \end{array}$$

$$\varphi = 80^\circ 24' 21''. \text{ Дакле}$$

$$c = \frac{4}{\cos 80^\circ 24' 21''}$$

$$\begin{array}{r} \log c = 0.602060 \dots \dots \dots \log (a-b) \\ -0.220954 + 1 \dots \dots \dots \log \cos \varphi \text{ за по-} \\ \hline 1.381106 \text{ лупречникъ 1} \\ -934 \\ \hline 172 \end{array}$$

и одтуда

$$c = 24.0$$

Найпосле

$$\begin{array}{l} 3.) \quad T = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} 42.38 \cdot \sin 34^\circ 27' 22'' \\ = 21.38 \cdot \sin 34^\circ 27' 22'', \text{ дакле} \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \log T = 1.322219 \dots \log \frac{1}{2} a \\
 1.579784 \dots \log b \\
 0.752643 - 1 \dots \log \sin C \\
 \hline
 2.654646 \\
 - 562 \\
 \hline
 840 : 96 = 8
 \end{array}$$

и отудъ

$$T = 451.48$$

3.) Познате су две стране a и b , и већой супротный $\angle A$; траже се дакле трећа страна c , угли B и C и садржай T .

§. 78.

У овоме случаю имамо прво по §у 56.

$$a : b = \sin A : \sin B, \text{ дакле}$$

$$\sin B = \frac{b \cdot \sin A}{a}, \text{ чимъ добыямо } \angle B$$

а съ овимъ и трећий $\angle C$, ерѣ $C = 180 - (A + B)$.

Трећу страну c находимо по томъ изъ сраз-
мерности

$$a : c = \sin A : \sin C, \text{ изъ кое слѣдуе}$$

$$c = \frac{a \cdot \sin C}{\sin A}.$$

Найпосле садржай триугла налази се у овомъ случаю као годъ у пређашнѣмъ.

§. 79.

Задржаваюћи узетый већъ примеръ имамо у настоѣщемъ случаю по горнѣму

$$1.) \sin B = \frac{38. \sin 81^\circ 55' 54''}{42}$$

$$= \frac{19. \sin 81^\circ 55' 54''}{21}$$

$$\begin{array}{r} \log \sin B = 1'278754 \dots \dots \log 19 \\ 9'995679 \dots \dots \log \sin A \\ \hline 11'274433 \\ -1'322219 \dots \dots \log 21 \\ \hline 9'952214 \\ -168 \\ \hline 46 : 1'05 = 44'' \text{ дакле} \end{array}$$

$$\angle B = 63^\circ 36' 44''$$

$$\angle C = 180 - (A + B) = 34^\circ 27' 22''$$

$$2.) c = \frac{42. \sin 34^\circ 27' 22''}{\sin 81^\circ 55' 54''}$$

$$\begin{array}{r} \log c = 1'623249 \dots \dots \log a \\ 9'752576 \left. \vphantom{\begin{array}{l} 9'752576 \\ 67 \end{array}} \right\} \dots \dots \log \sin C \\ 67 \\ \hline 11'375892 \\ -9'995679 \dots \dots \log \sin A \\ \hline 1'380213 \\ -1 \\ \hline 2 \\ c = 24.00 \end{array}$$

4.) Позната е една страна a съ оба на нъой лежећа угла B и C ; траже се дакле друге две стране b и c , трећій угаль A и садржай T .

§. 80.

У овомъ є, одъ свію найпростіємъ случаю, съ углама B и C познать и трећій A , и раванъ є

$180^\circ - (B + C)$; стране пакъ и садржай триугла налазимо као и у пређашњѣмъ случаю

$$b = \frac{a \sin B}{\sin A}, \quad c = \frac{a \sin C}{\sin A},$$

$$T = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{1}{2} bc \sin A$$

Примеръ е овде излишанъ.

6.) У НЕКИМЪ ОСОБИТЫМЪ СЛУЧАЄВИМА.

§. 81.

Осимъ ова четири проста случая, да разрешимо јошѣ неколико одъ оны, у којима е место едногъ или другогъ нуждногъ основка познать сбиръ или разлика друга два. Овы случаєва има при ко-соугломъ триуглу наравно много више него при правоугломъ; но мы се овде морамо ограничити на разрешенъ само оны, кои се логаритмично рачуна-ти могу. Таковы има четири и есу

1.) Задате су две стране a и b и разлика истима супротны углова $(A - B)$;

2.) Позната су два угла A и B — дакле и трећій C —, и сбиръ или разлика две стране, н. п. $(a + b)$ или $(a - b)$;

3.) Познать е еданъ угаль C , супротна страна c и сбиръ или разлика две друге стране, т. е. $(a + b)$ или $(a - b)$;

4.) Задата е една страна c , еданъ на нъой лежећій угаль н. п. B , и сбиръ или разлика остале две стране $(a + b)$ или $(a - b)$

§. 82.

У првомъ случаю определяемо найпре $\angle C$ помоћу образца

$$\operatorname{tang} \frac{C}{2} = \frac{a-b}{a+b} \cot \frac{1}{2} (A-B);$$

у другомъ разлику страна $(a-b)$ изъ познатогъ сбира образцемъ

$$a-b = (a+b) \cdot \operatorname{tang} \frac{1}{2} (A-B) \cdot \operatorname{tang} \frac{C}{2},$$

обратно сбиръ изъ познате разлике образцемъ

$$a+b = (a-b) \cot \frac{1}{2} (A-B) \cot \frac{C}{2}.$$

У трећемъ случаю тражимо найпре разлику углова $(A-B)$, и то: при познатомъ сбиру страна $(a+b)$ образцемъ

$$\cos \frac{1}{2} (A-B) = \frac{a+b}{c} \sin \frac{C}{2}, \text{ а при познатој разлики исты страна образцемъ}$$

$$\sin \frac{1}{2} (A-B) = \frac{a-b}{c} \cdot \cos \frac{C}{2}.$$

У четвртомъ наипосле случаю определяемо угаль A образцима

$$\cot \frac{A}{2} = \frac{(a+b)+c}{(a+b)-c} \cdot \operatorname{tang} \frac{B}{2}, \text{ и}$$

$$\operatorname{tang} \frac{A}{2} = \frac{c+(a-b)}{c-(a-b)} \cdot \operatorname{tang} \frac{1}{2} B,$$

првимъ, ако є познатъ сбиръ, а другимъ ако є позната разлика страна a и b .

Помоћу овы изнађены количина добыямо по томъ и све остале непознате основке триугла познатымъ већъ начинима одъ пређашњи прости случаева.

§. 83.

1.) Образацъ за првый случай слѣдуетъ изъ познате равенности (§. 57. подъ 2.)

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{\tan \frac{1}{2}(A+B)}{\tan \frac{1}{2}(A-B)}, \text{ узимаючи место } \frac{1}{2}(A+B) \text{ равну вредность } \frac{1}{2}(180-C) = 90^\circ - \frac{C}{2}; \text{ по чему, збогъ } \tan(90 - \frac{C}{2}) = \cot \frac{C}{2}, \text{ слѣдуетъ}$$

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{\cot \frac{1}{2}C}{\tan \frac{1}{2}(A-B)} = \frac{\cot \frac{1}{2}(A-B)}{\tan \frac{1}{2}C}$$

и одтуда увиђавнымъ начиномъ првый образацъ, као што е наведенъ

$$\tan \frac{C}{2} = \frac{a-b}{a+b} \cot \frac{1}{2}(A-B).$$

2.) Изъ овога подаю се далѣ

$$\begin{aligned} a-b &= \frac{(a+b) \tan \frac{1}{2}C}{\cot \frac{1}{2}(A-B)} \\ &= (a+b) \tan \frac{C}{2} \tan \frac{1}{2}(A-B) \text{ и} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a+b &= \frac{(a-b) \cot \frac{1}{2}(A-B)}{\tan \frac{1}{2}C} \\ &= (a-b) \cot \frac{1}{2}(A-B) \cot \frac{C}{2} \end{aligned}$$

образци другога случая.

§. 84.

1.) Збогъ $\cot \varphi = \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi}$ имамо изъ последнѣ равенности предходећегъ §.

$$a + b = (a - b) \cdot \frac{\cos \frac{1}{2} (A - B) \cos \frac{1}{2} C}{\sin \frac{1}{2} (A - B) \sin \frac{1}{2} C}.$$

Будући є пакъ $a = \frac{c \cdot \sin A}{\sin C}$, $b = \frac{c \cdot \sin B}{\sin C}$; то є

$$a + b = \frac{c (\sin A + \sin B)}{\sin C} = \frac{c \cdot \sin \frac{1}{2} (A + B) \cos \frac{1}{2} (A - B)}{\sin C}$$

или збогъ $\sin \frac{1}{2} (A + C) = \sin \frac{1}{2} (180 - C) =$
 $= \sin (90^\circ - \frac{C}{2}) = \cos \frac{C}{2}$, и $\sin C = 2 \sin \frac{C}{2} \cos \frac{C}{2}$,

$$a + b = \frac{c \cdot \cos \frac{1}{2} (A - B)}{\sin \frac{1}{2} C},$$

кою вредность у горнѣ уравненіе поставляюћи и
уєдно скраћуюћи, слѣдує

$$c = (a - b) \frac{\cos \frac{1}{2} C}{\sin \frac{1}{2} (A - B)}, \text{ и одтуда}$$

$$\sin \frac{1}{2} (A - B) = \frac{a - b}{c} \cdot \cos \frac{C}{2},$$

кое є другій образаць трећегъ случая. Подоб-
нымъ начиномъ налазимо и првый.

2.) По §у є 60.

$$\operatorname{tang} \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(S - b)(S - c)}{S(S - a)}}$$

$$\operatorname{tang} \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(S - a)(S - c)}{S(S - b)}}$$

Ова уравненія єданпутъ мложєћи, а другій
путъ прво чрезъ друго делећи, добыямо

$$\begin{aligned} \operatorname{tang} \frac{A}{2} \operatorname{tang} \frac{B}{2} &= \frac{\operatorname{tang} \frac{1}{2} B}{\cot \frac{1}{2} A} = \frac{S - c}{S} = \frac{a + b - c}{a + b + c} = \\ &= \frac{(a + b) - c}{(a + b) + c} \text{ и} \end{aligned}$$

$$\frac{\operatorname{tang} \frac{1}{2} A}{\operatorname{tang} \frac{1}{2} B} = \frac{S-b}{S-a} = \frac{a+c-b}{c+b-a} = \frac{c+(a-b)}{c-(a-b)}, \text{ и од-}$$

туда односно

$$\cot \frac{A}{2} = \frac{(a+b)+c}{(a+b)-c} \operatorname{tang} \frac{B}{2} \text{ и}$$

$$\operatorname{tang} \frac{A}{2} = \frac{c+(a-b)}{c-(a-b)} \operatorname{tang} \frac{B}{2},$$

образце четвртогъ случая.

Б.) Употреблѣнѣ дѣякошиѣга на разрешенѣ
неколико геометричны задатака.

1. Разрешенѣ неколико задатака о кругу
и правилномъ полигону.

§. 85.

сл. 1.

Нека є у слики 1. лукъ $MM_1 = \psi$, нѣгова те-
тивка $MDM_1 = s$, управна на тетивку $CD \equiv h$, най-
после полупречникъ $MC = AC = M_1C = r$.

За овай полупречникъ быт' ѣе тадѣ половина те-
тивке MD синусъ полуугла ψ , т. є. $\frac{s}{2} = \sin_r \frac{\psi}{2}$ и-

ли за полупречникъ 1, $\frac{s}{2} = r \cdot \sin \frac{\psi}{2}$, и одтуда

$$s = 2r \cdot \sin \frac{\psi}{2} \dots \dots \dots (1.$$

Изъ кое равенности слѣдую друге две

$$r = \frac{s}{2 \sin \frac{\psi}{2}} \dots \dots \dots (2. \text{ и}$$

$$\sin \frac{\psi}{2} = \frac{s}{2r} \dots \dots \dots (3.)$$

Помоћу овы равенности у станю смо разреши-ти слѣдуюћа, геометріомъ неразрешена три за-датка :

1.) Изъ познатоѣ полупречника r и познатоѣ лука ψ , изнаћи овоме луку принадлежећу тетивку s .

2.) Изъ познатоѣ лука ψ и нѣгове тетивке s определити полупречникъ r ; и

3.) Изъ познатоѣ полупречника r и тетивке s изнаћи овомъ тетивкомъ затегнутый лукъ ψ .

§. 86.

Првый и другій одъ горњи образаца добыяю особиту важность при правилномъ полигону, ерь се съ нѣма изъ познатоѣ полупречника r може изнаћи страна свакоѣ таковоѣ полигона и обратно изъ ове полупречникъ, око истоѣ полигона написано-го круга. При тьма є задатцима ψ као средишт-ный угаль свагда познать, и раванъ $\frac{360^\circ}{n}$, озна-чуюћи съ n брой страна. Половина є дакле тога угла $\frac{\psi}{2} = \frac{180^\circ}{n}$, и по томе имамо за разрешенѣ исты задатака

$$s = 2r \cdot \sin \frac{180^\circ}{n}, \text{ а}$$

$$r = \frac{s}{2 \sin \frac{180^\circ}{n}}$$

§. 87.

Садржай правилнога полигона може се тригонометрично такођеръ изнаћи, и, као што ћемо одма видети, много лакше него познатимъ изъ геометрије начиномъ. По овоме є садржай полигона

$$P = nt = n \cdot \frac{sh}{2},$$

при чему s страну MM_1 , а h висину CD триугла MCM_1 , дакле $t = \frac{sh}{2}$ садржай овога триугла представляю, каковы триуглова у правилномъ N -няку има као што знамо, n .

Сматрајући слику налазимо, да є $h = \cos \frac{\psi}{2}$
 $= r \cos \frac{\psi}{2}$, s є пакъ, по првомъ образцу §а 85, $=$
 $= 2r \sin \frac{\psi}{2}$; дакле садржай полигона $P = n \cdot \frac{s}{2} \cdot h$
 $= n \cdot r^2 \sin \frac{\psi}{2} \cos \frac{\psi}{2}$, или, збогъ $2 \sin \frac{\psi}{2} \cos \frac{\psi}{2}$
 $= \sin \psi$ (§. 26. обр. 1.), и дакле $\sin \frac{\psi}{2} \cos \frac{\psi}{2} =$
 $= \frac{1}{2} \sin \psi$, $P = \frac{n}{2} r^2 \sin \psi$; наипосле место ψ нѣ-
гову вредность узимајући,

$$P = \frac{n}{2} r^2 \sin \frac{180^\circ}{n}. \quad \text{То ће рећи:}$$

Садржай правилнога полигона раванъ є полу-
брою страна, помложеномъ съ производомъ ква-
драта полупречника и синуса половине средиш-
тногъ угла.

§. 88.

Задатакъ. Изъ познатогъ лука ψ и полупречника r , изнаѣи садржай окружногъ окрайка MAM_1DM (слика 1.)

сл. 1.

Разрешенѣ. Познато є изъ геометріє, да се садржай окрайка добья, ако се одъ садржая клина $СММ_1$ одузме садржай триугла $МСМ_1$.

Садржай є клина $K = \frac{\psi}{360^\circ} \cdot r^2 \pi$, а садржай триугла по §. 87.

$$t = r^2 \frac{\sin \psi}{2} ; \text{ дакле}$$

$$\begin{aligned} \text{садржай окракай } O &= K - t = \frac{\psi}{360} r^2 \pi - r^2 \frac{\sin \psi}{2} \\ &= \frac{22 \cdot r^2 \psi}{7 \cdot 360} - r^2 \frac{\sin \psi}{2} \\ &= \frac{11 r^2 \psi}{1260} - r^2 \frac{\sin \psi}{2} \end{aligned}$$

Да бы овай изразъ удесили за удобно употреблѣнѣ логаритама, извуцимо найпре $\frac{11}{1260} r^2 \psi$ као чинителя оба члана и заменимо потомъ другій чланъ съ косинусомъ помоѣногъ некогъ угла ω ; быт' ће

$$O = \frac{11}{1260} r^2 \psi \left(1 - \frac{630 \cdot \sin \psi}{11 \cdot \psi} \right).$$

Поставляюѣи пакъ као што рекосмо

$$\frac{630 \sin \psi}{11 \cdot \psi} = \cos \omega \dots \dots \dots (\alpha, \text{ имамо}$$

$$O = \frac{11}{1260} r^2 \psi (1 - \cos \omega), \text{ или збогъ}$$

$$1 - \cos \omega = 2 \sin^2 \frac{\omega}{2} \text{ (§. 27. обр. првый подъ 6.)}$$

$$O = \frac{11}{630} r^2 \psi \sin^2 \frac{\omega}{2}$$

Садржай окрайка дакле изнаћи ћемо, ако найпре определимо изъ уравненія подъ α помоћный угаль ω и овога вредность поставимо потомъ у последнѣ уравненіе.

§. 89.

Да е овай рачунъ много краћій него дояко познатый, увиђа се на првый погледъ. Но онъ е уедно и много лакшій, ерѣ не само, да при истомъ тетивку никако неупотребляемо, него се јошъ и оба изрази, коє логаритмички израчунати имамо, у већой части изъ еднаки броева састое, и дакле едначимъ и логаритмима рачунаю. Еданъ ће насъ примеръ о свему овоме најболѣ уверити. Нека е дакле $\psi = 38^\circ$, $r = 8$. У овомъ е случаю

$$\cos \omega = \frac{630 \sin 30^\circ}{11.38}$$

$$\begin{array}{r} \log \cos \omega = 2.799341 \dots \dots \log 630 \\ + 9.789342 \dots \dots \log \sin 38^\circ \\ \hline 12.588683 \\ - 1.041393 \dots \dots \log 11 \\ 1.579784 \dots \dots \log 38 \\ \hline 9.967506 \\ - 471 \\ \hline 35 : 0.85 = 41 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 21^{\circ} 54' \\ - 41'' \\ \hline \omega = 21^{\circ} 53' 19'', \quad \frac{\omega}{2} = 10^{\circ} 56' 39'' \end{array}$$

$$O = \frac{11}{630} \cdot 64 \cdot 38 \cdot \sin^2 10^{\circ} 56' 39''$$

$$\begin{array}{r} \log O = 1.041393 \dots \log 11 \text{ (само преписанъ)} \\ + 1.806180 \dots \log (8^2 = 64) \\ + 1.579784 \dots \log 38 \text{ (преписанъ)} \\ \quad 0.277991 - 1 \\ \hline + 0.555982 - 2 \dots \log \sin \frac{\omega}{2} \text{ за пол. 1} \\ \hline 2.983339 \\ - 2.799341 \dots \log 630 \text{ (преписанъ)} \\ \hline 0.183998 \\ - 839 \\ \hline 1590 : 285 = 5 \end{array}$$

$$O = 1.5275 = 1.53$$

II. Опредѣляванъ неприступны одстоянія.

§. 90.

1.) **Задатакъ.** Определити на едномъ краю *В* неприступно одстояніе *AB*. (сл. 11.)

сл. 11.

Разрешенъ. Изъ приступне точке *A* треба подъ произвольнымъ угломъ означити и измерити праву *AC*, и потомъ угломеромъ узети угле *A* и *C*; тымъ ћемо одъ триугла *ABC* знати едну страну *AC* и оба на нъой лежећа угла *A* и *C*, непознато дакле одстояніе *AB*, као страна истога триугла, быт' ће

$$AB = \frac{AC \cdot \sin C}{\sin B}$$

или, збогъ $B = 180 - (A + C)$, и дакле $\sin B = \sin (A + C)$,

$$AB = \frac{AC \cdot \sin C}{\sin (A + C)}$$

Изъ позднѣе увиђавны узрока валя помоћну AC прво подъ што оштрѣемъ угломъ на AB поставити, и друго одъ прилике равну AB узети, да бы упливъ погрешногъ угла C на ову маный быо т. е. ова точнѣе добила се.

§. 91.

2.) **Задатакъ.** Определити на оба края или сасвимъ неприступну AB . (сл. 12.)

Разрешенѣ. Узети валя и измерити помоћну праву CD , изъ краєва кое могу се видити оба края неприступне AB . Почемъ смо іошъ угломеромъ измерили у C угле C и β , а у D угле D и α , бытѣе

$$AD = \frac{CD \cdot \sin C}{\sin \alpha} = \frac{CD \cdot \sin C}{\sin (C + \alpha)}, \quad \text{а}$$

$$BD = \frac{CD \cdot \sin \beta}{\sin b} = \frac{CD \cdot \sin \beta}{\sin (D + \beta)}$$

Одъ триугла дакле ABD познате су садъ две нѣгове стране AD и BD са заключенымъ угломъ $(D - \alpha) = \phi$, и трећа нѣгова страна бытѣе, по §. 75. (уравненіе подъ β),

$$AB = \frac{AD - BD}{\cos \phi},$$

при чему помоћный угаль ϕ налазимо изъ уравненія

$$\operatorname{tang}^2 \varphi = \frac{4 \cdot AD \cdot BD}{(AD - BD)^2} \cdot \sin^2 \frac{\delta}{2}$$

§. 92.

3.) **Задатакъ.** Часть $PQ = x$ праве MN , (н. пр. неке основице), збогъ неке препоне неможе се измерити; зато да се определи рачуномъ.

Разрешенѣ. Измерит'ѣ се угломеромъ, изъ сходно узете точке O , угли $MOP = \alpha$, $MOQ = \beta$, $MON = \gamma$. Поставляюћи потомъ познату часть $MP = a$, а $QN = b$, быт'ѣ

$$a : MO = \sin \alpha : \sin p,$$

$$b : NO = \sin (\gamma - \beta) : \sin q,$$

$$(a + x) : MO = \sin \beta : \sin n = \sin \beta : \sin (180 - q) \\ = \sin \beta : \sin q,$$

$$(b + x) : NO = \sin (\gamma - \alpha) : m = \sin (\gamma - \alpha) : \sin (180 - p) \\ = \sin (\gamma - \alpha) : \sin p;$$

и одтуда редомъ

$$\sin p = \frac{MO \cdot \sin \alpha}{a},$$

$$\sin q = \frac{NO \cdot \sin (\gamma - \beta)}{b},$$

$$\sin q = \frac{MO \cdot \sin \beta}{a + x},$$

$$\sin p = \frac{NO \cdot \sin (\gamma - \alpha)}{b + x}; \quad \text{дакле}$$

$$\frac{MO \cdot \sin \alpha}{a} = \frac{NO \cdot \sin (\gamma - \alpha)}{b + x} \quad \text{и}$$

$$\frac{MO \cdot \sin \beta}{a+x} = \frac{NO \cdot \sin (\gamma - \beta)}{b}, \text{ или}$$

$$\frac{MO}{NO} = \frac{a \cdot \sin (\gamma - \alpha)}{(b+x) \sin \alpha} = \frac{(a+x) \sin (\gamma - \beta)}{b \sin \beta};$$

одавде пакъ слѣдуе

$$(a+x)(b+x) = \frac{ab \sin \beta \sin (\gamma - \alpha)}{\sin \alpha \sin (\gamma - \beta)}, \text{ или}$$

$$x^2 + (a+b)x = \frac{ab}{\sin \alpha \sin (\gamma - \beta)} \left[\sin \beta \sin (\gamma - \alpha) - \sin \alpha \sin (\gamma - \beta) \right]$$

$$= ab \cdot \frac{\sin \gamma \sin (\beta - \alpha)}{\sin \alpha \sin (\gamma - \beta)},$$

кое уравненіе разрешаючи добыямо

$$x = -\frac{a+b}{2} + \sqrt{\left[ab \cdot \frac{\sin \gamma \sin (\beta - \alpha)}{\sin \alpha \sin (\gamma - \beta)} + \frac{(a+b)^2}{4} \right]}$$

$$= -\frac{a+b}{2} + \frac{a+b}{2} \sqrt{\left[\frac{4ab \cdot \sin \gamma \sin (\beta - \alpha)}{(a+b)^2 \sin \alpha \sin (\gamma - \beta)} + 1 \right]}$$

$$= \frac{a+b}{2} \left\{ -1 + \sqrt{\left[\frac{4ab \cdot \sin \gamma \sin (\beta - \alpha)}{(a+b)^2 \sin \alpha \sin (\gamma - \beta)} + 1 \right]} \right\},$$

или, поставляючи

$$\frac{4ab \sin \gamma \sin (\beta - \alpha)}{(a+b) \sin \alpha \sin (\gamma - \beta)} = \tan^2 \varphi \dots \dots (m,$$

$$x = \frac{a+b}{2} \left[-1 + \sqrt{(\tan^2 \varphi + 1)} \right]$$

$$= \frac{a+b}{2} (-1 + \sec \varphi) = \frac{a+b}{2} \cdot \frac{1 - \cos \varphi}{\cos \varphi},$$

и наипосле, збогъ $1 - \cos \varphi = 2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}$,

$$x = (a+b) \frac{\sin^2 \frac{1}{2} \varphi}{\cos \varphi}$$

Неизмерену дакле часть x наћи немо, ако найпре уравненіемъ m определимо помоћный $\angle \varphi$ и поставимо потомъ нѣгову вредность у последнѣ уравненіе за x .

III. Опредѣляванѣ висина.

§. 93.

Задатакъ. Определити неприступну висину CD . (сл. 14.)

сл. 14.

Разрешенѣ 1. Узети и измерити валя сходну основцу AB , и у єдномъ нѣномъ краю A угломеромъ измерити управне угле v и w и горизонтальный угаль α , у ономъ другомъ пакъ краю B горизонтальный угиль β .

Изъ горизонталногъ триугла ABH слѣдуе

$$AH = \frac{AB \cdot \sin \beta}{\sin H} = \frac{AB \sin \beta}{\sin (\alpha + \beta)};$$

изъ управногъ пакъ и правоуглогъ триугла ADH подае се

$$AD = \frac{AH}{\cos v} = \frac{AB \cdot \sin \beta}{\sin (\alpha + \beta) \cos v}$$

Наипосле изъ управногъ косоуглогъ триугла ADC добыямо

$$CD = \frac{AB \sin \beta \sin (w - v)}{\sin (\alpha + \beta) \cos v \cos w}.$$

Разрешенъ 2. По измереной основици AB и управны углова v и w узеће се угломеромъ іошъ у косой равници ACB лежећи угли γ и δ .

Изъ триугла ACB имамо потомъ

$$AC = \frac{AB \sin \delta}{\sin C} = \frac{AB \sin \delta}{\sin (\gamma + \delta)},$$

изъ управногъ пакъ триугла ACD

$$\begin{aligned} CD &= \frac{AC \sin (w - v)}{\sin (180^\circ - D)} = \frac{AC \sin (w - v)}{\sin D} \\ &= \frac{AC \sin (w - v)}{\cos v}, \end{aligned}$$

или AC съ нађеномъ вредности заменяюћи

$$CD = \frac{AB \sin \delta \sin (w - v)}{\sin (\gamma + \delta) \cos v}$$

Приметбе. 1. Ако є основица AB у хоризонту точке D , тадъ є, као што се лако увиђа, угаль $v = 0$, и дакле при првомъ разрешенію

$$CD = \frac{AB \sin \beta \sin w}{\sin (\alpha + \beta) \cos w},$$

а при другомъ

$$CD = \frac{AB \sin \delta \sin w}{\sin (\gamma + \delta)}.$$

2. Ако є пакъ основица AB надъ хоризонтомъ точке D , онда угаль v неиде у висъ него на ниже, и збогъ тога истый угаль валя узети съ угломъ w

противнымъ, т. е. съ отрицательнымъ знакомъ или $-v$. У томъ же дакле случаю быти при првомъ разрешеню

$$CD = \frac{AB. \sin \beta \sin (w - v)}{\sin (\alpha + \beta) \cos v \cos w},$$

а при другомъ

$$CD = \frac{AB. \sin \delta \sin (w + v)}{\sin (\gamma + \delta) \cos v}$$

§. 94.

Ако основицу AD (сл. 15.) по правцу AD не само у горизонту точке D узети, но у томъ и мерити можемо, онда треба измерити угломеромъ у краю A само управный угаль p , а у краю B угаль q ; бытъ же потомъ изъ триугла ACB

сл. 15.

$$AC = \frac{AB. \sin q}{\sin \delta},$$

или, збогъ $p = \delta + q$, и дакле $\delta = p - q$:

$$AC = \frac{AB. \sin q}{\sin (p - q)}; \text{ изъ правоуглогъ пакъ}$$

триугла ACD

$$CD = AC. \sin p$$

или AC съ наѣеноме вредности заменяючи

$$CD = \frac{AB. \sin p. \sin q}{\sin (p - q)}$$

IV. Потеноговъ проблемъ.

§. 95.

Задатакъ. Определити положенъ точке D према задатымъ у полю точкама A, B , и C . (сл. 16.)

сл. 16.

Разрешенѣ. У име овога треба у точки D определити угле α и β , подѣ коима се у истой точки виде задатога триугла стране $AC = b$ и $BC = a$. У сбиру иста два угла $\alpha + \beta$ познатъ е и угалъ ADB , подѣ коимъ се примећава трећа триугла страна AB . Поставимо краћине ради

$$\alpha + \beta = \gamma \dots\dots\dots (1)$$

По себи увиђа се, да е положенѣ точке D савршено определѣно углима φ и ψ , и дакле да намъ у име разрешеня поставлѣногъ задатка само исте угле изнаћи валя.

По обштемъ свойству триугла имамо изъ триугла ADC :

$$DC : b = \sin \varphi : \sin \beta, \text{ дакле}$$

$$DC = \frac{b \sin \varphi}{\sin \beta};$$

изъ триугла пакъ BDC :

$$DC : a = \sin \psi : \sin \alpha, \text{ и одтудъ}$$

$$DC = \frac{a \sin \psi}{\sin \alpha}$$

Поставляюћи ове вредности за DC єдну другою равну, быт'ће

$$\frac{b \sin \varphi}{\sin \beta} = \frac{a \sin \psi}{\sin \alpha}, \text{ одкуда слѣдує}$$

$$\frac{\sin \varphi}{\sin \psi} = \frac{a \sin \beta}{b \sin \alpha}.$$

Одузимаюћи одъ овогъ уравненія єдиницу и смешане броеве у разломке преобраћаюћи добыямо далѣ

$$\frac{\sin \varphi - \sin \psi}{\sin \psi} = \frac{a \sin \beta - b \sin \alpha}{b \sin \alpha}.$$

Додаючи му пакъ единицу слѣдує

$$\frac{\sin \varphi + \sin \psi}{\sin \psi} = \frac{a \sin \beta + b \sin \alpha}{b \sin \alpha}$$

Найпосле прво одъ овы уравненія другимъ делећи налазимо

$$\frac{\sin \varphi - \sin \psi}{\sin \varphi + \sin \psi} = \frac{a \sin \beta - b \sin \alpha}{a \sin \beta + b \sin \alpha}$$

Но по §. є 23. $\sin \varphi - \sin \psi = 2 \cos \frac{\varphi + \psi}{2} \chi$
 $\chi \sin \frac{\varphi - \psi}{2}$, а $\sin \varphi + \sin \psi = 2 \sin \frac{\varphi + \psi}{2} \cos \frac{\varphi - \psi}{2}$;
 зато ове вредности у предходеће уравненіє узи-
 маючи

$$\cot \frac{1}{2}(\varphi + \psi) \tan \frac{1}{2}(\varphi - \psi) = \frac{a \sin \beta - b \sin \alpha}{a \sin \beta + b \sin \alpha} = \frac{1 - \frac{b \sin \alpha}{a \sin \beta}}{1 + \frac{b \sin \alpha}{a \sin \beta}},$$

или

$$\frac{b \sin \alpha}{a \sin \beta} = \tan \delta \dots \dots \dots (2)$$

поставляючи

$$\cot \frac{1}{2}(\varphi + \psi) \tan \frac{1}{2}(\varphi - \psi) = \frac{1 - \tan \delta}{1 + \tan \delta}$$

$$\text{По §у є 22. } \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

Поставляючи $\alpha = 45^\circ$, $\beta = \delta$, быће збогъ
 $\tan 45^\circ = 1$,

$$\tan(45^\circ - \delta) = \frac{1 - \tan \delta}{1 + \tan \delta}, \text{ и зато}$$

$$\cot \frac{1}{2} (\varphi + \psi) \tan \frac{1}{2} (\varphi - \psi) = \tan (45^\circ - \delta) \dots (3)$$

Будући су далѣ угли свакогъ триугла скупа равни 180° , то су угли триуглова ABC и BDC за-
едно $= 2.180^\circ$, то ће рећи, угли $\varphi + \psi + C + \alpha +$
 $+ \beta = 360^\circ$. Одтуда имамо съ обзиромъ на уравне-
ніе подъ (1, $\varphi + \psi = 360 - (C + \gamma)$, и дакле

$$\frac{1}{2} (\varphi + \psi) = 180^\circ - \frac{1}{2} (C + \gamma) \dots (4 \text{ познато.})$$

Заменяюћи наипосле у уравненію подъ (3
 $\frac{1}{2} (\varphi + \psi)$ съ овомъ вредности подае се

$$\tan \frac{1}{2} (\varphi - \psi) = \frac{\tan (45^\circ - \delta)}{\cot [180^\circ - \frac{1}{2} (C + \gamma)]} \dots (5)$$

Прегледаюћи садъ цео посао увиђамо, да
угле φ и ψ налазимо помоћу уравненія подъ 1, 2,
4 и 5 тимъ начиномъ: да найпре определимо изъ
уравненія 2.) помоћный угаль δ , изъ 4.) помоћу
1.) $\frac{1}{2} (\varphi + \psi)$, а по уравненію 5.) помоћу 4.) $\frac{1}{2} (\varphi - \psi)$,
па онда $\frac{1}{2} (\varphi + \psi)$ и $\frac{1}{2} (\varphi - \psi)$ еданпутъ саберемо,
а другій путъ едно одъ другога одузмемо.

§. 96.

При овомъ валя іошъ приметити, да ће се
угли φ и ψ добити положителни, ако падаю на
ону исту страну страна a и b на којој леже угли
 A и B , лежала при томъ точка D — као у сматра-
ной слики — изванъ триугла или у самомъ три-
углу. Напротивъ угли φ и ψ испадаю одрицател-
ни, ако є нѣово положенѣ према странама a и b
противно положенію угла A и B , кое ће бити
ако є точка D у D_1 . Наипосле овај є задатакъ
сасвимъ неразрешимъ — єръ неопредѣльнъ, — ако

се угли φ и ψ узаямно допунюю до 180° , кое ће бити, ако точка D лежи у периферіи преко точкій A , B и C пролазећегъ круга.

V. Среднѣнѣ углава.

§. 97.

При већемъ премеравању догађа се выше пута, да се потребный некій угаль ACB неможе сматрати изъ свога врха C , но нѣгови су краци $AC=a$ и $BC=b$ при томъ определѣни. У таковомъ случаю поставлямо угломеръ у другой некой точки c_1, c_2, c_3 , или c_4 , меримо одстояніе $c_1C=c_2C=c_3C=c_4C=d$ и сматрамо угле α и β , изъ чега свега определяемо затимъ найпре угле x и y , а помоћу нѣи потомъ вопросный угаль $ACB=C$. Разрешенѣ овога задатка познато е подѣ именима среднѣнѣ — центрація — углава, или пренашанѣ — редукція — на средиште или врхъ.

сл. 17. I.
II. и III.,

§. 98.

При истомъ задатку разликуемо обично у смотреню помоћне точке c свега три разна случая, но лако е увидити, да су последня два у главномъ само особити случаеви првога, и да намъ зато показати валя разрешенѣ задатка у првомъ само случаю, изъ коега потомъ, даюћи само углима x и y особите вредности, разрешенѣ она друга два слѣдуе само собомъ.

§. 99.

Самымъ сматранѣмъ слика' увиђа се, да е у првомъ случаю (сл. 17. I.)

сл. 17. I.

$$\angle C = c_1 + (x + y)$$

или $C = c_2 - (x + y)$ почемъ е помоћна точка c или изванъ угла C или пакъ у нѣму.

У другомъ е случаю (сл. 17. II) съ истомъ приметбомъ у смотреню точкѣй c_1 и c_2 или c_3 и c_4 :

$$\angle C = c_1 + x = c_2 - x = c_3 + y = c_4 - y.$$

Найпосле у трећемъ случаю (сл. 17. III.)

$$\angle C = c_1 + (x - y) = c_2 - (x - y).$$

Угаль C дакле налазимо ако, према случаю, сматраномъ углу c_1, c_2, c_3 или c_4 угле x и y єдан-путь оба додамо или оба одъ нѣга одузмемо; другій путь само єданъ додамо или одузмемо; трећій путь найпосле єданъ додамо а онай другій одузмемо

За првый случай имамо

$$\sin x = \frac{d \sin \alpha}{a} \text{ и } \sin y = \frac{d \sin \beta}{b}$$

за другій е случай, при комъ е или y или $x = 0$,

$$\sin x = \frac{d \sin \alpha}{a} \text{ ако } y = 0, \text{ а } \sin y = \frac{d \sin \beta}{b}$$

ако е $x = 0$.

У трећемъ е найпосле случаю за помоћну точку у c_1

$$\sin x = \frac{d \sin (\alpha_1 + \beta)}{a}, \sin y = \frac{d \sin \beta_1}{b},$$

за помоћну пакъ точку у c_2

$$\sin x = \frac{d \sin \alpha}{a}, \sin y = \frac{d \sin (\alpha_2 + \beta_2)}{b}.$$

КНЬИГА ТРЕЋА.

СФЕРИЧНА ТРИГОНОМЕТРІЯ.

А.) Уводна понятія и правила; свойства сферичны триуглова, и основна уравненія сферичне тригонометріє.

I. Уводна понятія и правила.

§. 100.

Изъ Стереометріє знамо веѣтъ, да є свакій пресекъ сѣере са некомъ равницомъ окружіє, и да се таковый пресекъ по средишту сѣере зове и єсть найвеѣе окружіє, сви пакъ другій пресеци зову се маня окружія.

Одтуда увидили смо іошѣ

1.) Да є полупречникъ свакогъ найвеѣегъ окружія раванъ полупречнику сѣере, збогъ чега су сва найвеѣа окружія єдне и исте сѣере међу собомъ равна.

2.) Да се найвеѣа окружія, пресецаюћи се узаямно преполавляю, єрѣ є нѣовѣ пресекъ пречникъ сѣере; збогъ чега се и нѣове периферіє на површію сѣере такођерѣ узаямно преполавляю



3.) Да права, коя средиште сфере сѣдняя-ва са средиштемъ манѣгъ каковогогъ окружія, на ово управно стои, и обратно.

4.) Да є свако манѣ окружіє тымъ манѣ, што є одъ средишта сфере веѣма удалѣно и обратно.

5.) Да се преко сваке две точке на површїю сфере може повући єданъ найвеѣій кругъ; єрѣ та-кове две точке, и треѣа средиште сфере, савршено опредѣлюю равницу истогъ найвеѣегъ окружія. Ако оне две точке нису краєви сферичногъ пречника; тадѣ се преко исты може повући само єданъ найвеѣій кругъ; манѣи кругова напротивъ може преко исте две точке безбройно много пролазити.

§. 101.

Свака равница, коя се сфере само у єдної єдиной точки дотиче, назива се додирчицомъ сфере.

сл. 18. По предходеѣемъ є §у бр. 3. права Cc (сл. 18.) управна на равницу манѣгъ круга AB . Представимо себи, да се ова равница одъ средишта C све веѣма удалява, т. є. да се одстояніє нѣно Cc све веѣма увеѣава, докѣ наипосле непостане равно полупречнику Cy . У томъ є магновенїю кругъ AB увиѣавно савршено изчезао, равница пакѣ PQ , или сада pq , престала є пресецати сферу и постала є нѣномъ додирчицомъ у краю y полупречника Cy ; а будући є Cc при свомъ увеѣаванїю све єднако управна о-стала на равницу PQ : то є увиѣавно такоѣерѣ и то, да є полупречникѣ Cy управанѣ на додирчицу pq . По тому полупречникѣ повучекѣ на точку доди-раня управанѣ є на додирчицу; и обратно.

равнища, коя е у краю полупречника на овай управно поставлѣна, есте додирчища сфѣре.

Ово бы се могло доказати и онымъ начинномъ, коимъ е у геометріи доказано, да е полупречникъ у точки додирания управанъ на дѣрку, и обратно.

§. 102.

Точка на површю сфѣре, коя одъ некогъ на овой повученогъ круга свуда еднако одстои: назива се полусомъ истога круга.

Поставимо управно на пречникъ сфѣре P_1P_2 (сл. 19.) едно найвеће окружіе $ADBEA$ и едно ма-
нѣ $adbea$, а по нѣму самомъ — пречнику — осимъ P_1P_2 — осимъ $P_1AP_2BP_1$ іошъ два найвећа окружія $P_1DP_2EP_1$ и $P_1FP_2GP_1$. Тетивке овы кругова ab , de и fg , као пречници манѣгъ круга $adbea$; а AB , DE и FG као пречници найвећегъ круга $ADBEA$, єсу међу со-
бомъ равне и свака управнымъ пречникомъ сфѣре P_1P_2 преполовлѣна; равни су дакле и преполовлѣни истымъ пречникомъ и нѣови луци, т. є. $\text{arc } aP_2 = dP_1 = fP_1 = \dots$, $\text{arc } aP_1 = dP_2 = fP_2 = \dots$, $\text{arc } AP_1 = DP_1 = FP_1 = \dots = AP_2 = DP_2 = FP_2 = \dots = 90^\circ$; и по томе краєви пречника P_1P_2 єсу полуси оба на нѣга управна окружія.

сл. 19.

§. 103.

Изъ овога видимо

1.) Да свакій кругъ на сфѣри има два полуса, и да ови єсу краєви управногъ пречника сфѣре на истый кругъ. Оваковый пречникъ назива се осомъ круга; дакле

2.) Оса некога круга есте пречникъ сфере, кои нѣгове полусе сѣдинява, и стои на нѣгово окружїе управно.

3.) Полуси свакогъ найвећегъ круга есу уедно полуси и равноодстойногъ некогъ, манѣгъ круга.

4.) Найвећи кругови, кои еданъ преко полуса другогъ прелазе, есу еданъ на другїй управни; и обратно: узаямно еданъ на другїй управни найвећи кругови прелазе свакій преко полуса оногъ другогъ.

5.) Управни найвећи кругови на некїй трећїй, пресецаю се у полусима овогъ трећегъ круга. Полусе дакле найвећегъ (а по трећемъ доученю и полусе манѣгъ) некогъ круга налазимо: ако на истый поставимо два управна найвећа круга; прорези овы есу тражени полуси

6.) Точка на сфери, коя одъ две точке найвећегъ некогъ круга съ 90° одстои: есте нѣговъ полусъ. Полусъ дакле найвећегъ некогъ круга наћи ћемо, ако на истый поставимо два управна найвећа лука одъ 90° ; нѣювъ прорезъ бытѣе траженный полусъ.

7.) Свакій найвећїй лукъ међу найвећимъ некимъ кругомъ и нѣговымъ полусомъ раванъ е 90° .

§. 104.

сл. 19.

Нека е у пређашњой слики полупречникъ сфере $AC = DC = R$, полупречникъ равноодстой-

ногъ манѣгъ круга $ac = dc = r$, найпосле угаль $aCA = dCD = \alpha$. Као управница правоуглогъ триугла aCc быт'ће

$$r = R. \cos \alpha$$

Ако дакле поделимо найвећій некій кругъ $ADBEA$ у точкама A, D, F и т. д. на выше равны частій, и положимо потомъ по овима и полусима истога круга найвеће кругове: ови ће поделити равноодстойный кругъ $adbea$ у точкама a, d, f и т. д. такођеръ на равне части, и отношенъ части єднога према части другога быт'ће

$$AD : ad = R : r$$

или r съ горньомъ вредности заменяюћи

$$AD : ad = 1 : \cos \alpha$$

Овомъ сразмерности єсмо у станю определити степень равноодстойногъ манѣгъ круга посредствомъ степена найвећегъ, и обратно; у име чега, означуюћи степень првога съ g , степень пакъ найвећегъ съ G , имамо

$$G : g = 1 : \cos \alpha$$

и одтуда

$$g = G. \cos \alpha, \text{ обратно } G = \frac{g}{\cos \alpha}$$

§. 105.

По себи є увиђавно, да се найвећій некій кругъ никаковымъ манѣмъ неможе пресећи на равне части, већъ свагда на єдну маню, а другу већу одъ 180° . На противъ свакій манїй кругъ преполавля се єднымъ найвећимъ

сл. 20.

Ово предпошлюћи повуцимо садъ на сфери (сл. 20.) єданъ маный кругъ $adbca$, кои се съ найвећимъ $aDbEa$ пресеца у тетивки ab ; и положимо га потомъ око ове тетивке у равницу найвећега круга.

По горнѣму тетивка ab затеже у найвећемъ кругу два лука aDb и aEb , првый већій, а другій маный одъ 180° . Овай маный, као лукъ већега круга, краћій є одъ свакогъ одъ два, истомъ тетивкомъ затегнута лука ae_1b или ad_1b манѣга круга; єрѣ єдна иста тетивка затеже у манѣмъ кругу свагда већій лукъ него у већемъ. Ово постои, као што се увиђа, и о луцима свакогъ другогъ съ найвећимъ кругомъ пресецаюћегъ се манѣга круга, и по томе

Одъ свію међу исте две точке на сфери повучены лукова, онай, кои є часть найвећега круга, бытѣе пайкраћій, ако є маный одъ 180° , а найдужій, ако є већій одъ 180° .

По обичномъ, єрѣ наравномъ понятію, разумева се подъ одстояніемъ два предмета свагда найкраће нѣово одстояніє; збогъ тога мы ћемо у будуће, на основу горнѣга докученя, одстояніє две точки на сфери свагда определити манымъ одъ два, међу истымъ точкама повучена лука найвећегъ круга.

§. 106.

Часть површія сфере заключена одъ три лука пресецаюћи се найвећи кругова, назива се сферичнымъ триугломъ, а заключаюћи га исти луци єсу нѣгове стране. При овомъ предпоставля се свагда, да ни єдна страна триугла нїє већа одъ 180° ; єрѣ є свакій сферичанъ триугалъ, при комъ

бы єдна, две или све три стране веће были одъ 180° , свагда определѣнъ триугломъ. коєга су стране суплементи нѣговы страна, т. є. манѣ одъ 180° .

§. 107.

Угли, подъ коима се она три окружія, коя луцима своима сферичанъ триугаль заключую, међу собомъ пресецаю, зову се сферични угли и появлюю се на сфери међу странама триугла, збогъ чега се обычно подъ сферичнымъ углима, разумеваю ови угли на сфери.

Свакій сферичанъ угаль DCE (или на сфери DAE (сл. 21.) мери се

сл. 21.

1.) угломъ FAG , кои образую дирке FA и GA , повучепе у точки A на луке DA и EA ; єрь су исте дирке у равниама пресецаюћи се окружія, и као такове у точки A управне на прорезъ окружія AB , збогъ чега є угаль $FAG = DCE$.

2.) Лукомъ DE , повученымъ изъ A као полуса међу луке AD и AE , съ одстояніемъ одъ 90° ; єрь су при томъ луци $AD = AE = 90^\circ$, а збогъ тога $\left. \begin{matrix} DC \\ EC \end{matrix} \right\} \perp AB$, и лукъ DE часть najveћегъ окружія т. є. угаль DCE нагибный угаль пресецаюћи се окружія или сферичный угаль, а лукъ DE нѣгова мера.

Изъ овога увиђа се јошъ а.) да су очелни угли, кои постаю пресецањемъ два лука, єданъ другомъ равни (у слики угли DAE и dAe); б.) да се сферични угли међу собомъ сравнити могу посредствомъ najveћи лукова, написаны међу нѣове краке

изъ врхова као полуса', и в.) начинъ, коимъ се равни сферични угли построяваю.

§. 108.

Сферични триугли зову се равнострани, равнокраки, правоугли или подобни у онымъ истымъ случаєвымъ, у којима припадаю та имена обичнымъ триуглима. Осимъ своју тїю триуглова имамо јошъ и тако назване поларне триугле. То су сферични триугли, кои постаю, ако се изъ врхова другога сферичнога триугла као полуса, напишу највећи луци до узаямнога пресецања. Тако е н. п. у слици 22. $A_1B_1C_1$ поларный триугалъ триугла ABC и мы ћемо позднїе увидити, да е обратно опетъ овај поларный триугалъ онога.

сл. 22.

II. Свойства сферичны триуглова.

§. 109.

При свакомъ е сферичномъ триуглу сбиръ две стране већїй одъ треће нѣгове стране.

Да бы се о овомъ уверили, повуцимо у сферичномъ триуглу ABC (сл. 23.) тетивке лукова AB , BC и CA . Тимъ добыямо обичанъ триугалъ ABC , о коємъ е већъ познато, да е сбиръ две нѣгове стране свагда већїй одъ треће стране; дакле

сл. 23.

$$\text{chord. } AB + \text{chord. } AC > BC.$$

Будући су пакъ луци AB , BC и AC луци највећи кругова, и ови равнога полупречника: то се исти луци могу сматрати као луци еднога истога круга, а нѣгове тетивке као тетивке у томъ кругу. Но тадъ одма собомъ слѣдує, да, кадъ е сбиръ две

тетивке већій одъ треће, и сбиръ истымъ тетивка-
ма принадлежећи лукова већій мора быти одъ те-
тивке трећегъ лука; дакле

$$\text{arc } AB + \text{arc } AC > \text{arc } BC,$$

т. е. сбиръ две стране сферичногъ триугла већій е
доиста одъ треће стране.

§. 110.

Сбиръ страна свакогъ сферичногъ триугла
маный е одъ едногъ najveћегъ круга т. е. ма-
ный е одъ $4R$.

Продужимо при сферичномъ триуглу ABC (сл. 24.) две њгове стране AB и AC , докъ се непресе-
ку по другій путь у точки D . Луци BAD и BCD
быт'ће тадъ свакій $= 180^\circ$, еръ се najveћи круго-
ви узаямно преполаваляю. Но по пређашнѣмъ е §.
у триуглу ACD , $AC < AD + DC$, дакле додаюћи
свакой страни ове неравности сбиръ $AB + BC$, сл. 24.

$$AC + AB + BC < AD + DC + AB + BC,$$

или збогъ $AD + AB = BAD$, а $DC + BC = BCD$:

$$AC + AB + BC < BAD + BCD, \text{ т. е.}$$

$$< 180^\circ + 180^\circ \text{ или}$$

$$< 4R$$

§. 111.

Као годъ што су врхови сферичногъ некогъ
триугла ABC полуси супротни страна поларно-
га триугла: тако су исто обратно врхови овога,
полуси супротны страна онога.

Будући е врхъ A (сл. 22.) као полусъ лука B_1C_1 одъ сваке нѣгове точке еднако и то съ 90° удалѣнъ, то е точка A одъ B_1 , дакле и обратно B_1 одъ A у 90° удалѣна. Но тако исто одстои и точка C као полусъ лука A_1B_1 одъ точке B_1 дакле и обратно ова одъ нѣ съ 90° . Слѣдователно точка B_1 одстои одъ две точке A и C лука AC одъ сваке съ 90° , и есть по тому полусъ истога лука. Сасвимъ истымъ начиномъ можемо доказати, да е точка A_1 полусъ лука BC , а точка C_1 полусъ лука AB . Тако дакле врхови поларнога триугла $A_1B_1C_1$ есу доиста полуси супротны страна триугла ABC , и овай е збогъ тога обратно поларный триугаль онога.

§. 112.

сл. 22.

Угли еднога, и супротне стране другога поларнога триугла, допунюю се узаямно до 180° .

По §. 107. е мера угла A лукъ $b\gamma$, дакле

$$A + B_1C_1 = b\gamma + B_1C_1 = b\gamma + (B_1\gamma + C_1b - b\gamma) = B_1\gamma + C_1b,$$

а будући е $B_1\gamma = C_1b = 90^\circ$, то е дакле

$$A + A_1C_1 = 180^\circ \quad \text{истимъ е начиномъ}$$

$$B + A_1C_1 = 180^\circ$$

$$C + A_1B_1 = 180^\circ$$

По истомъ е §. мера угла A_1 лукъ Bc , дакле

$$A_1 + BC = \beta c + BC = (Bc + C\beta - BC) + BC = Bc + C\beta,$$

или збогъ $Bc = C\beta = 90^\circ$,

$$A_1 + BC = 180^\circ. \quad \text{Исто тако налазимо}$$

$$B_1 + AC = 180^\circ$$

$$C_1 + AB = 180^\circ.$$

§. 113.

Сбиръ углова свакогъ сферичногъ триугла маный є одъ $6R$, а векий одъ $2R$.

Означуюћи съ A, B и C угле некогъ сферичногъ триугла, а дотично съ a_1, b_1 и c_1 истыма супротне стране поларногъ триугла, имамо по горѣму

$$(A + a_1) + (B + b_1) + (C + c_1) = 6R, \text{ или}$$

$$\alpha) \dots A + B + C + (a_1 + b_1 + c_1) = 6R, \text{ и одтуда}$$

$$A + B + C = 6R - (a_1 + b_1 + c_1), \text{ и дакле}$$

$$(A + B + C) < 6R.$$

Будући є пакъ по §. 110. сбиръ страна поларнога триугла $a_1 + b_1 + c_1 < 4R$, то є іошъ, ову неравность одъ уравненія (α одузимаюћи

$$(A + B + C) > (6R - 4R), \text{ т. є. } > 2R$$

Слѣдства. 1.) Будући да углы свакогъ сферичногъ триугла леже међу $2R$ и $6R$, то у сферичномъ триуглу може быти два и три права угла, а могу быти и сви углы тупи, но збогъ предходегъ §. свакий $< 180^\circ$. 2.) Ако су у триуглу два права угла, онда су истымъ углама супротне стране свака 90° , и дакле врхъ трегъга угла бытѣ полусъ супротне му стране. 3.) Ако су сви углы у сферичномъ триуглу прави, онда су све три стране четвртине круга, т. є. истый є триугалъ уєдно и свой поларный триугалъ, а нѣгова є површина осма часть површія сфере.

§. 114.

Триугли на истой сфери есу савршено равни, ако имаю 1.) све три стране, 2.) две стране и заключеный угаль, 3.) едну страну и оба на нъой лежећа угла, и наипосле 4.) сва три угла саотвѣтственно равна.

Докази за прва три случая исти су као у геометріи, у четвртомъ пакъ можемо доказати савршену равеность триуглова помоћу поларны ньювы триуглова слѣдующимъ начинѣмъ.

Збогъ саотвѣтственно равны углова при вопроснымъ триуглима есу по преѣащнѣмъ §. стране поларны триуглова саотвѣтственно равне, дакле су и угли овы триуглова саотвѣтственно равни; но кадъ су угли у поларнымъ триуглима равни, онда су по истомъ §. обратно и саотвѣтствене стране у вопроснымъ триуглима равне, и ови потѣме, имаюћи равне угле и равне стране, еданъ другомъ савршено равни

§. 115.

У равнокракомъ сферичномъ триуглу есу угли на трећей страни еданъ другомъ равни, и обратно: ако су ови угли равни, онда е триугаль равнокракъ.

Да бы се о овомъ уверили одсецимо на равнымъ крацима $AD = DE$ (сл. 25.) и положимо потѣмъ преко D и B найвећій лукъ DB , а преко E и A найвећій лукъ EA . Будући е и $CD = CE$, то су триугли DCB и ECA , имаюћи две стране са заключенымъ угломъ C саотвѣтственно равне, еданъ другомъ савршено равни, збогъ чега е $AE = BD$.

Сматраюћи садъ іошъ триугле ABE и BAD налази-мо, да су и они савршено равни, ерѣ су имъ све три стране саотвѣтственно равне, т. е. $BC = AD$, $AE = BD$, а $AB = AB$ као заєдничка страна; равни су дакле и саотвѣтственіи угли, а међу овима $\angle ABE = \angle BAD$, угли на основіци равнокракогъ триугла.

Да є обратно збогъ равны углова на єдної страні триугалъ равнокракъ, доказуємо по одсече-номъ $AD = BE$ слѣдуюћимъ начиномъ:

Збогъ $AB = AB$, $AD = BE$ и $\angle DAB = EBA$, триугли су BAD и ABE савршено равни, и зато $BD = AE$, $\angle a_1 = b_1$, $d_1 = e_1$; збогъ овога є опетъ $a = b$, $d = e$, и по томе триугли ACE и BCD такођеръ савршено равни, дакле и $DC = EC$. Садъ имамо

$$DC = EC \text{ и } AD = BE, \text{ дакле}$$

$$DC + AD = EC + BE, \text{ или}$$

$$AC = BC,$$

а то ће рећи: триугалъ є ACB равнокракъ.

Додатакъ. Лукъ найвећегъ круга, повученъ изъ половине основіце — трећа или неравна страна — равнокракогъ сферичногъ триугла на супрот-ный врхъ, стои управно на основіцу, и обратно: управный лукъ изъ врха равнокракогъ триугла на основіцу, преполавля основіцу. Докази за ово єсу врло лаки и оставляю се збогъ тога почетни-ку на упражненіє.

§. 116.

У свакомъ є сферичномъ триуглу већемъ углу супротна страна већа, и обратно већой страні супротный угалъ већій.

сл. 26.

Нека е у триуглу ABC (сл. 26.) угалъ $ACB > CAB$.
 Построивши у точки C угалъ $DCA = CAB$ бытъе
 по предходеhemъ §у триугалъ ADC равнокракъ, и од-
 туда $AD = CD$. Но по §. е 109. $CD + DB > CB$,
 или CD съ равнымъ AD заменяюући, $AD + DB > CB$,
 т. е.

$$AB > CB,$$

и тако доиста веhemъ углу супротна страна већа.

За обратный доказъ можемо употребити по-
 ларный триугалъ. Ако е страна $AB > BC$, онда е
 збогъ $AB + C_1 = 180^\circ$ и $BC + A_1 = 180^\circ$, увиђав-
 но угалъ $C_1 < A_1$, и дакле углу A_1 супротна стра-
 на B_1C_1 поларнога триугла по горнѣму већа одъ
 нѣгове, углу C_1 супротне стране A_1B_1 . Но по свой-
 ству е поларны триуглова $B_1C_1 + A = 180^\circ$, и $A_1B_1 +$
 $+ C = 180^\circ$; слѣдователно е угалъ

$$A < C,$$

т. е. већой страны AB супротный угалъ већій.

§. 117.

Изъ стереометріе знамо већъ, да се садржай
 кришке има према површію сфере као найвећа
 ширина кришке према 360° ; сада пакъ увиђамо,
 да ова найвећа ширина кришке ништа друго нїе,
 но мера нѣнога угла, и по томе отношенї кришке
 према површію целе сфере изражено е отноше-
 нїемъ нѣнога угла према 360° . Изъ овога слѣ-
 дуе далъ, да кришке едне исте сфере међу
 собомъ у истомъ отношенїу стое као нїовы
 угли.

§. 118.

Садржай свакогъ сферичногъ триугла може се определити сувишкомъ нѣговъ углова надъ 180° .

Да бы ово лакше доказали, узмимо на сфери триугалъ ABC (сл. 27.) тако, да една нѣгова страна AB лежи у найвећемъ кругу $ABabA$, кои представля сферу (т. е. да е иста страна часть овога круга), и попунимо потомъ оне друге две нѣгове стране AC и BC до целы кругова. Ови ће се, као што се лако увиђа, по другій путь пресећи на противной половини сфере у точки c .

сл. 27.

По §. е 100.

$$ACa = AC + Ca = 180^\circ, \text{ као годъ што е и}$$

$$Cac = Ca + ac = 180^\circ; \text{ дакле } AC = ac.$$

Истымъ начиномъ налазимо јошъ да е $BC = bc$, а $AB = ab$. Триугли дакле ABC и abc имаю све три стране саотвѣтственно равне, и есу по томе савршено равни и едногъ истогъ садржая.

Означуюћи далъ површіе сфере съ S , подае намъ се изъ саме слике

$$\triangle ABC + \triangle ACb + \triangle Abc + \triangle AcB = \frac{S}{2};$$

но будући е, као што се по себи увиђа, кришка $ABaCA = abAca$: то е, збогъ $\triangle ABC = abc$,

$$ABaCA - ABC = abAca - abc, \text{ т. е.}$$

$$\triangle aBC = \triangle Abc, \text{ и дакле,}$$

узимаюћи место $\triangle Abc$ триугалъ aBC ,

$$\triangle ABC + \triangle ACb + \triangle aBC + \triangle AcB = \frac{S}{2} \dots (\alpha)$$

Садъ имамо по предходе́немъ §.

$$\text{кришка } ABaCA = \triangle ABC + \triangle aBC = \frac{A}{360} \cdot S,$$

$$,, \quad BAbaCA = \triangle ABC + \triangle ACb = \frac{B}{360} \cdot S,$$

$$,, \quad CAcBC = \triangle ABC + \triangle ABc = \frac{C}{360} \cdot S;$$

дакле, ова три уравненія сабираюћи,

$$3 \triangle ABC + \triangle aBC + \triangle ACb + \triangle ABc = S \frac{A+B+C}{360},$$

$$\text{или } 2. \triangle ABC + \triangle ABC + \triangle aBC + \triangle ACb + \\ + \triangle ABc = S \frac{A+B+C}{360}, \text{ а}$$

съ обзиромъ на уравненіе (α)

$$2. \triangle ABC + \frac{S}{2} = S \frac{A+B+C}{360}, \text{ и одтуда}$$

$$\triangle ABC = \frac{S}{8} \cdot \frac{A+B+C-180}{R};$$

при чему є, као што знамо, $R = 90^\circ$.

Изъ овогъ уравненія слѣдує сразмерность

$$\triangle ABC : \frac{S}{8} = (A+B+C-180^\circ) : R,$$

у којой є осимъ $\triangle ABC$, т. є. осимъ нѣгового сдр-
жая, све друго познато. Сматраюћи дакле осму часть

сфере $\frac{S}{8}$ као единицу површія, а правый угаль R

као единицу угла: т. є. $\frac{S}{8} = 1$ и $R = 1$, бытѣ у

овомъ смислу

$$\triangle ABC = (A + B + C)^{\circ} - 180^{\circ}. \quad (*)$$

Изъ свега овога увиђа се довольно, да се садржай некогъ сферичногъ триугла ABC доиста може определити сувишкомъ нѣговы углова надъ 180° или два права угла. Овай сувишакъ углова триугла ABC надъ 180° назива се нѣовымъ эксцесомъ.

Горня сразмерность показуе, да е осма часть сферичногъ површїя у вопросномъ триуглу оно-либо пута садржана, колико у эксцесу нѣговы углова има правы углова.

III. Основна уравненїя за разрешенїе сферичны триуглова.

§. 119.

Као годъ што смо у равной тригонометріи сматрали полупречникъ круга као единицу, тако исто узимамо и овде, да е полупречникъ сфере, на кою ће се наша испытываня односити, такођеръ единица. Ово еданпутъ за свагда споминюћи, повуцимо у врху A сферичнога триугла ABD (сл. 28.) на нѣгове стране AB и AD дирке AE и AF , и продужимо полупречнике AB и AD до пресецања съ истымъ диркама у точкама E и F . Означуюћи юшѣ краѣине ради AB , AD и BD односно съ d , b и a , имамо по томъ за условный полупречникъ

сл. 28.

$$AE = \tan b, \quad AF = \tan d, \quad CE = \sec b, \quad CF = \sec d.$$

*) Овай е изразъ садржая сферичногъ триугла одъ хвално познатого Холандеза Алберта Жирар-а (Albert Girard).

Изъ правостраны пакъ триугола CEF и AEF слѣдуетъ по §. 59.

$$\begin{aligned}\overline{EF}^2 &= \overline{CE}^2 + \overline{CF}^2 - 2 \cdot \overline{CE} \cdot \overline{CF} \cdot \cos ECF \text{ и} \\ &= \overline{AE}^2 + \overline{AF}^2 - 2 \cdot \overline{AE} \cdot \overline{AF} \cos EAF,\end{aligned}$$

или, по замени съ предходеѣмъ изразима и обзиромъ на то, да ѡ

$$\begin{aligned}\angle ECF &= a, \text{ а } \angle EAF = \text{сфер. } \angle A: \\ \sec^2 b + \sec^2 d - 2 \sec b \cdot \sec d \cdot \cos a &= \tan^2 b + \tan^2 d - \\ &\quad - 2 \tan b \cdot \tan d \cos A.\end{aligned}$$

Изражаваюѣи далѣ у овомъ уравненію квадрате секанта съ тангентама, и потомъ скраѣуюѣи добыямо

$$\sec b \cdot \sec d \cdot \cos a - 1 = \tan b \cdot \tan d \cos A$$

или, секанте и тангенте іошъ синусима и косинусима заменяюѣи,

$$\cos a - \cos b \cdot \cos d = \sin b \cdot \sin d \cos A;$$

одавде пакъ слѣдуетъ

$$\cos A = \frac{\cos a - \cos b \cdot \cos d}{\sin b \cdot \sin d}.$$

Истымъ начиномъ добыямо

$$\cos B = \frac{\cos b - \cos a \cos d}{\sin a \cdot \sin d}.$$

$$\cos D = \frac{\cos d - \cos a \cos b}{\sin a \cdot \sin b}.$$

..... (1.

§. 120.

Означуюѣи стране горнѣмъ триуглу принадлежеѣегъ полярногъ триугла съ a_1 , b_1 и d_1 а нѣгове угле дотично съ A_1 , B_1 и D_1 , имамо по §. 112.

$$a = 180^\circ - A_1, \quad b = 180^\circ - B_1, \quad d = 180^\circ - D_1$$

$$\text{и } A = 180^\circ - a_1$$

Ове вредности у горњѣ уравненіе место a , b , d и A узимаюћи слѣдує

$$-\cos a_1 = \frac{-\cos A_1 - \cos B_1 \cos D_1}{\sin B_1 \sin D_1}, \text{ дакле}$$

$$\cos a_1 = \frac{\cos A_1 + \cos B_1 \cos D_1}{\sin B_1 \sin D_1}, \text{ или}$$

сказальке (на увиђавномъ основу) изоставляюћи

$$\cos a = \frac{\cos A + \cos B \cos D}{\sin B \sin D}$$

Подобно налазимо за остале две стране

$$\left. \begin{aligned} \cos b &= \frac{\cos B + \cos A \cos D}{\sin A \sin D} \\ \cos d &= \frac{\cos D + \cos A \cos B}{\sin A \sin B} \end{aligned} \right\} \dots \dots (2.)$$

§. 121.

Изражаваюћи у образцу §. 119. $\cos A$ полу-
угломъ, узимаюћи т. е. єданпутъ $\cos A = 2\cos^2 \frac{A}{2} - 1$,

а другій путъ $\cos A = 1 - 2\sin^2 \frac{A}{2}$ добыямо, ако при
томъ у єдно єдиницу у другу часть пренесемо и
ову уредимо,

$$\begin{aligned} 1.) \quad 2\cos^2 \frac{A}{2} &= \frac{\cos a - \cos b \cos d + \sin b \sin d}{\sin b \sin d} \\ &= \frac{\cos a - \cos (b + d)}{\sin b \sin d}, \end{aligned}$$

$$2.) \quad 2 \sin^2 \frac{A}{2} = \frac{\sin b \sin d - \cos a + \cos b \cos d}{\sin b \sin d}$$

$$= \frac{\cos(b-d) - \cos a}{\sin b \sin d};$$

или, збогъ $\cos \varphi - \cos \psi = -2 \sin \frac{\varphi + \psi}{2} \sin \frac{\varphi - \psi}{2} =$

$$= 2 \sin \frac{\varphi + \psi}{2} \sin \frac{\psi - \varphi}{2};$$

$$2 \cos^2 \frac{A}{2} = \frac{2 \sin \frac{1}{2} (a+b+d) \sin \frac{1}{2} (b+d-a)}{\sin b \sin d}$$

$$2 \sin^2 \frac{A}{2} = \frac{2 \sin \frac{1}{2} (a+b-d) \sin \frac{1}{2} (a+d-b)}{\sin b \sin d}$$

Съ 2 скраћуюћи и краћине ради іошъ $a+b+d=2S$ поставляюћи, слѣдуе найпосле

$$\cos^2 \frac{A}{2} = \frac{\sin S \sin (S-a)}{\sin b \sin d},$$

$$\sin^2 \frac{A}{2} = \frac{\sin (S-b) \sin (S-d)}{\sin b \sin d}.$$

Истымъ начиномъ нашли бы іошъ

$$\cos^2 \frac{B}{2} = \frac{\sin S \sin (S-b)}{\sin a \sin d},$$

$$\cos^2 \frac{D}{2} = \frac{\sin S \sin (S-d)}{\sin a \sin b},$$

$$\sin^2 \frac{B}{2} = \frac{\sin (S-a) \sin (S-d)}{\sin a \sin d}$$

$$\sin^2 \frac{D}{2} = \frac{\sin (S-a) \sin (S-b)}{\sin a \sin b};$$

и оттуда редомъ

$$\begin{aligned}
 \cos \frac{A}{2} &= \sqrt{\frac{\sin S \sin (S-a)}{\sin b \sin d}} \\
 \sin \frac{A}{2} &= \sqrt{\frac{\sin (S-b) \sin (S-d)}{\sin b \sin d}} \\
 \cos \frac{B}{2} &= \sqrt{\frac{\sin S \sin (S-b)}{\sin a \sin d}} \\
 \sin \frac{B}{2} &= \sqrt{\frac{\sin (S-a) \sin (S-d)}{\sin a \sin d}} \\
 \cos \frac{D}{2} &= \sqrt{\frac{\sin S \sin (S-d)}{\sin a \sin b}} \\
 \sin \frac{D}{2} &= \sqrt{\frac{\sin (S-a) \sin (S-b)}{\sin a \sin b}}
 \end{aligned}
 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \right\} \dots \dots (3)$$

§. 122.

По § 6 26. $\sin A = 2 \sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2}$, или узи́маю-
ћи за $\sin \frac{A}{2}$ нѣіове вредности, кое се подаю изъ
горньи израза:

$$\sin A = \frac{2 \sqrt{\sin S \sin (S-a) \sin (S-b) \sin (S-d)}}{\sin b \sin d},$$

краћине пакъ ради, $\sqrt{\sin S \sin (S-a) \sin (S-b) \sin (S-d)}$
= w поставляюћи,

$$\sin A = \frac{2w}{\sin b \sin d}$$

Истимъ начиномъ налазимо

$$\sin B = \frac{2w}{\sin a \sin d}, \sin D = \frac{2w}{\sin a \sin b};$$

дакле

$$\sin A : \sin B : \sin D = \frac{2w}{\sin b \sin d} : \frac{2w}{\sin a \sin b} : \frac{2w}{\sin a \sin d},$$

или, десна одношеня съ $2w$ скраћуюћи, а съ $\sin a$
 $\sin b \sin d$ множећи,

$$\sin A : \sin B : \sin D = \sin a : \sin b : \sin d \dots\dots (4)$$

т. е. Синуси угла сферичнога триугла имаю
се као синуси супротны страна.

§. 123.

Мложенѣмъ и деобомъ дотичны образаца §.
121. добыямо

$$\frac{\sin \frac{1}{2} A \cos \frac{1}{2} B}{\cos \frac{1}{2} D} = \frac{\sin (S - b)}{\sin d} \dots\dots\dots (\alpha)$$

$$\frac{\sin \frac{1}{2} B \cos \frac{1}{2} A}{\cos \frac{1}{2} D} = \frac{\sin (S - a)}{\sin d} \dots\dots\dots (\beta)$$

$$\frac{\sin \frac{1}{2} A \sin \frac{1}{2} B}{\sin \frac{1}{2} D} = \frac{\sin (S - d)}{\sin d} \dots\dots\dots (\gamma)$$

$$\frac{\cos \frac{1}{2} A \cos \frac{1}{2} B}{\sin \frac{1}{2} D} = \frac{\sin S}{\sin d} \dots\dots\dots (\delta)$$

Додаюћи друго уравненіе првомъ, и одузи-
маюћи га одъ нѣга, слѣдуе

$$\frac{\sin \frac{1}{2} (A \pm B)}{\cos \frac{1}{2} D} = \frac{\sin (S - b) \pm \sin (S - a)}{\sin d}$$

или, збогъ $\sin \varphi + \sin \psi = 2 \sin \frac{1}{2} (\varphi + \psi) \cos \frac{1}{2} (\varphi - \psi)$,
 $a \sin \varphi - \sin \psi = 2 \cos \frac{1}{2} (\varphi + \psi) \sin \frac{1}{2} (\varphi - \psi) - \S. 23. -$

$$\frac{\sin \frac{1}{2} (A+B)}{\cos \frac{1}{2} D} = \frac{2 \sin \frac{1}{2} (2S-a-b) \cos \frac{1}{2} (a-b)}{\sin d}$$

$$= \frac{2 \sin \frac{1}{2} d \cos \frac{1}{2} (a-b)}{\sin d}, \quad a$$

$$\frac{\sin \frac{1}{2} (A-B)}{\cos \frac{1}{2} D} = \frac{2 \cos \frac{1}{2} (2S-a-b) \sin \frac{1}{2} (a-b)}{\sin d}$$

$$= \frac{2 \cos \frac{1}{2} d \sin \frac{1}{2} (a-b)}{\sin d};$$

найпосле $\sin d$ полуугломъ изражаваючи и разло-
макъ потомъ скраћуючи,

$$\left. \begin{aligned} \frac{\sin \frac{1}{2} (A+B)}{\cos \frac{1}{2} D} &= \frac{\cos \frac{1}{2} (a-b)}{\cos \frac{1}{2} d} \\ \frac{\sin \frac{1}{2} (A-B)}{\cos \frac{1}{2} D} &= \frac{\sin \frac{1}{2} (a-b)}{\sin \frac{1}{2} d} \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots (5.$$

Подобнымъ начинемъ налазимо, ако треће
уравненіе четвртомъ додамо и одъ истога одузмемо,

$$\left. \begin{aligned} \frac{\cos \frac{1}{2} (A-B)}{\sin \frac{1}{2} D} &= \frac{\sin \frac{1}{2} (a+b)}{\sin \frac{1}{2} d} \\ \frac{\cos \frac{1}{2} (A+B)}{\sin \frac{1}{2} D} &= \frac{\cos \frac{1}{2} (a+b)}{\cos \frac{1}{2} d} \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots (6.$$

Ова четири уравненія позната су подъ именомъ
Гаусовы (Гауѣ) уравненія.

§. 124.

Делећи прво одъ горњи уравненія четвртимъ, а друго трећимъ, добыямо

$$\operatorname{tang} \frac{1}{2} (A + B) \operatorname{tang} \frac{D}{2} = \frac{\cos \frac{1}{2} (a - b)}{\cos \frac{1}{2} (a + b)} \quad \text{и}$$

$$\operatorname{tang} \frac{1}{2} (A - B) \operatorname{tang} \frac{D}{2} = \frac{\sin \frac{1}{2} (a - b)}{\sin \frac{1}{2} (a + b)}, \quad \text{и од-}$$

туда

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{tang} \frac{1}{2} (A + B) &= \frac{\cos \frac{1}{2} (a - b)}{\cos \frac{1}{2} (a + b)} \cot \frac{D}{2} \\ \operatorname{tang} \frac{1}{2} (A - B) &= \frac{\sin \frac{1}{2} (a - b)}{\sin \frac{1}{2} (a + b)} \cot \frac{D}{2} \end{aligned} \right\} \dots (7.)$$

Деобомъ пакъ другога чрезъ прво, а трећегъ чрезъ четврто слѣдуе

$$\operatorname{tang} \frac{1}{2} (a - b) \cot \frac{d}{2} = \frac{\sin \frac{1}{2} (A - B)}{\sin \frac{1}{2} (A + B)} \quad \text{и}$$

$$\operatorname{tang} \frac{1}{2} (a + b) \cot \frac{d}{2} = \frac{\cos \frac{1}{2} (A - B)}{\cos \frac{1}{2} (A + B)},$$

дакле

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{tang} \frac{1}{2} (a - b) &= \frac{\sin \frac{1}{2} (A - B)}{\sin \frac{1}{2} (A + B)} \cdot \operatorname{tang} \frac{d}{2} \\ \operatorname{tang} \frac{1}{2} (a + b) &= \frac{\cos \frac{1}{2} (A - B)}{\cos \frac{1}{2} (A + B)} \cdot \operatorname{tang} \frac{d}{2} \end{aligned} \right\} \dots (8.)$$

Ова опетъ четири уравненія есу тако назване Неперове *) сферичне аналогіе.

*) Лордъ Цовъ Неперъ (Lord John Napier или обично Neper).

§. 125.

Одма у почетку сферичне тригонометріє рекли смо, да ћемо изъ наведени узрока сматрати само оне триугле, кои имаю стране манъ одъ 180° . Испытуюћи садъ обзиромъ на ову приметбу последнѣ уравненіе §. 123., увиђамо, да су у истомъ $\sin \frac{D}{2}$ и $\cos \frac{d}{2}$ збогъ $\frac{D}{2}$ на свакій начинъ $<$ одъ 180° (§. 113.), а $\frac{d}{2} < 90^\circ$, свагда положителни, косинусъ дакле одъ $\frac{1}{2}(A+B)$ и $\cos \frac{1}{2}(a+b)$ свагда еднакога знака. Но ово, као што є такођеръ лако увидити, неможе бити иначе, него само ако су сбирови $(A+B)$ и $(a+b)$ єднородни, т. є. или оба већи, или оба равни, или наипосле оба манъ одъ 180° ; зато є при свакомъ сферичномъ триуглу сбиръ две стране свагда $\begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} 180^\circ$, ако є сбиръ истымъ странама супротны угла $\begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} 180^\circ$; и обратно.

Б.) Разрешенъ сферичны триуглова.

I. Разрешенъ правоуглогъ триугла.

§. 126.

У §. 113. видели смо, да правоуглы сферичны триуглова има трояки, сирѣчь съ єднымъ, съ два и съ три права угла.

При триуглу съ два права угла єсу две нѣгове стране четвртине круга, а трећа є страна мера

косога угла. При триуглу пакъ съ три права угла єсу све три стране одъ 90° . Ови су дакле триугла подпуно определѣни, и нама по томе само іошъ остає показати разрешенѣ правоуглогъ триугла съ єднимъ само правымъ угломъ.

§. 127.

Означимо у име тога єданпутъ за свагда правый угаль съ D , а коссе угле съ A и B , дакле, по єданпутъ већъ уведеномъ начину, пречницу съ d , а управнице съ a и b .

Мы знамо, да є правоуглый триугаль подпуно определѣнъ, ако су осимъ правога угла іошъ два нѣгова основка позната. Свако дакле уравненіє за разрешенѣ таковога триугла мора садржати три основка, два позната, а єданъ непознатъ. Почемъ се пакъ далъ петъ основака — осимъ правога угла — по три на слѣдуюћій десеторый начинъ међу собомъ саюзити могу

$$\begin{aligned} & d^1ab, d^2aA, d^3aB, d^4bA, d^5bB, d^6AB, a^7bA, \\ & a^8bB, a^9AB, b^{10}AB : \end{aligned}$$

то имамо при правоугломъ триуглу свега десетъ вопросны случаєва, и потребуємо дакле за нѣгово разрешенѣ толико исто уравненія. Ова налазимо найлакше слѣдуюћимъ начиномъ.

§. 128.

Збогъ $D = 90^\circ$, дакле $\sin D = 1$, а $\cos D = 0$: слѣдує

1.) изъ трећегъ уравненія §. 119. подъ (1.

$$\cos d = \cos b \dots \dots \dots (\alpha$$

2.) изъ тре҃гѣгъ уравненія подѣ (2. у §. 120.

$$\cos d = \cot A. \cot B \dots \dots (\beta.$$

3.) наипосле изъ уравненія подѣ (4. у §. 122.

$$\left. \begin{array}{l} \sin a = \sin A \sin d \\ \sin b = \sin B \sin d \end{array} \right\} \dots \dots (\gamma.$$

Поставляю҃и садѣ у прво уравненіе подѣ (1. §. 119. наипре место $\cos d$, а после место $\cos a$ нѣю-ве вредности по горнѣмъ уравненію подѣ (α ., добыямо

$$\begin{aligned} 1.) \cos A &= \frac{\cos a - \cos a. \cos^2 b}{\sin b. \sin d} = \frac{\cos a (1 - \cos^2 b)}{\sin b. \sin d} \\ &= \frac{\cos a. \sin^2 b}{\sin b. \sin d} = \frac{\cos a. \sin b}{\sin d}, \end{aligned}$$

или, збогѣ $\sin d = \frac{\sin a}{\sin A}$ по првомъ уравненію подѣ (γ .

$$\cos A = \frac{\cos a. \sin b. \sin A}{\sin a}, \text{ и одтудѣ}$$

$$\cot A = \cot a. \sin b \dots \dots (\delta.$$

$$\begin{aligned} 2.) \cos A &= \frac{\cos d (1 - \cos^2 b)}{\sin b. \sin d. \cos b} = \frac{\cos d. \sin^2 b}{\sin b. \sin d. \cos b} \\ &= \frac{\cos d. \sin b}{\sin d. \cos b}, \text{ т. е.} \end{aligned}$$

$$\cos A = \tan b. \cot d \dots \dots (\epsilon.$$

Подобнымъ начиномъ изъ другоѣ уравненія истога §.

$$\cot B = \cot b \cdot \sin a \dots\dots (\zeta. \text{ и}$$

$$\cos B = \tan a \cdot \cot d \dots\dots (\eta.$$

Найпосле мложећи уравненія подъ (ε и (η. пр-во съ другимъ, а друго съ првымъ подъ (γ. слѣдуе

$$\cos A \cdot \sin b = \tan b \cdot \cot d \cdot \sin B \cdot \sin d, \text{ и}$$

$$\cos B \cdot \sin a = \tan a \cdot \cot d \cdot \sin A \cdot \sin d, \text{ т. ε.}$$

$$\cos A = \frac{\sin B \cdot \cos d}{\cos b}, \text{ а}$$

$$\cos B = \frac{\sin A \cdot \cos d}{\cos b},$$

или узимаюћи место $\cos d$ нѣгову вредность изъ уравненія (α., и потомъ скраћуюћи

$$\left. \begin{array}{l} \cos A = \sin B \cdot \cos \alpha \\ \cos B = \sin A \cdot \cos b \end{array} \right\} \dots\dots (\vartheta.$$

§. 129.

Сравниваюћи међу собою све могуће, у §. 127. наведе не саюзе основака правоуглогъ триугла, увиѣдомо лако, да су 2. и 5., 3. и 4., 7. и 8., 9. и 10. само знацима разни, по смыслу пакъ истовѣтны; и дакле да по бытности разликуюћи се случаева при разрешеніи правоуглога триугла имамо свега само шесть, одъ кои

првый, садржаваюћи пречницу и обе управниці, разрешава се уравненіемъ подъ (α;

другій и петый, у коима є пречница, една управница и овой супротный угаль, уравненіями подъ (γ;

трекій и четвртый, сложени изъ пречнице, єдне управнице и на овой лежећегъ угла, подлеже уравненіями подъ (ε и (η;

шестый, сваћаяћи пречницу и оба косса угла, уравненію подъ (β;

седмый и осмый, у kojima су обе управнице
и еданъ угаль, определяю се уравненіама
подъ (δ. и (ζ. ; наипосле

деветый и десетый, садржећи едну управни-
цу и оба косса угла, уравненіама подъ (θ.

§. 130.

Дояко већъ выше пута споменутый Неперъ
поставіо е за разрешенъ правоуглогъ триугла два
врло проста и за памтенъ лака правила, коя, као
што ћемо мало сниже видити, садрже сва, у §. 128.
за исту цѣль изнађена уравненія.

Испытуюћи познаты 10 саюза (§. 127.) у смо-
треню положеня нѣовы основака — безъ обзира
на правый угаль, кои е безъ свакогъ уплива —,
налазимо: да у свакомъ саюзу има еданъ основакъ,
и само тай еданъ, према комъ оба друга основка
появляю се или као супротни, или као на нѣму
лежећи. Тога е свойства у 1. и 6. саюзу основакъ
 d , у 2. и 8. основакъ a , у 3. и 10. основакъ B , у
4. и 9. основакъ A , наипосле у 5. и 7. основакъ b .
Назаваюћи ове основке среднѣима, и узимаюћи
место управница a и b нѣове комплементе $(90^\circ - a)$
и $(90^\circ - b)$, — поменута два Неперова правила са-
стоѣ се у слѣдуюћемъ

1.) Косинусъ среднѣгъ основка раванъ е
производу котангента' на нѣму лежећа два о-
сновка, и

2.) Косинусъ среднѣгъ основка раванъ е
производу синуса супротны основака.

Првомъ подлежи, као што лако докучуемо 3.,
4., 6., 7. и 8., а другомъ 1., 2., 5., 9. и 10. случай; да-
кле svakимъ разрешава се половина могући случаѣва.

§. 131.

О основаности овы правила уверавамо се найбіль тымъ, што нѣовымъ надлежнымъ употреблѣнѣмъ добыямо за свакій случай изнаѣена уравненія подъ §. 128.

Тако н. п. налазимо 1.) за првый саюзъ dab , при комъ e пречница d по §. преѣашиѣмъ средній основакъ, а управнице a и b истомъ супротни основци, посредствомъ 2. правила

$$\begin{aligned}\cos d &= \sin(90^\circ - a) \cdot \sin(90^\circ - b) \\ &= \cos a \cdot \cos b,\end{aligned}$$

уравненіе подъ (а, као што по §. 128. за истый случай валя.

2.) За 4. саюзъ dbA , при комъ e средній основакъ A , а d и b на нѣму лежеѣи основци, по 1. правилу као што треба

$$\begin{aligned}\cos A &= \cot d \cdot \cot(90^\circ - b) \\ &= \cot d \cdot \tan b\end{aligned}$$

уравненіе подъ (е.

3.) За 8. саюзъ abB , у комъ e средній основакъ a , а b и B — правый угаль D не сматраюѣи — на томъ среднѣмъ лежеѣи основци, по истомъ — 2. — правилу

$$\cos(90^\circ - a) = \cot(90^\circ - b) \cot B, \text{ т. е.}$$

$$\sin a = \tan b \cdot \cot B, \text{ дакле}$$

$$\cot B = \frac{\sin a}{\tan b} = \sin a \cdot \cot b,$$

уравненіе подъ (з. као што треба. И т. д.

§. 132.

Изъ уравненія подъ (δ. у §. 128. слѣдуе

$$\sin b = \frac{\cot A}{\cot a} = \frac{\tan a}{\tan A}$$

Сматраючи ово уравненіе увиѣамо, да е $\sin b$ збогъ $b < 180^\circ$ (§. 106), свагда положителанъ, и дакле да $\tan a$ и $\tan A$ мораю имати свагда еданъ истый знакъ; но то ніе могуће иначе, него ако е управница a и супротный іой угаль A едногъ истога рода, то ће рећи обое $\geq 90^\circ$. То исто докучуемо и изъ уравненія подъ (ζ. у смотреню оне друге управнице b и супротногъ іой угла B , и по томе

при правоугломъ е триуглу свака управница $\geq 90^\circ$, ако е супротный угаль $\geq 90^\circ$; и обратно.

§. 133.

Изъ узрока што е свакій угаль и свака страна сферичногъ триугла у обште свагда $< 180^\circ$ (§. 106. и 113.): синусъ свакогъ нѣговогъ угла или сваке стране есте свагда положителанъ. Но мы знамо, да свакій таковый синусъ принадлежи двома углама, едномъ манѣмъ, а другомъ веѣемъ одъ 90° . Зато сви они вопросы при разрешеню сферичногъ триугла, у коима се непознатый основакъ определяе синусомъ, подлеже той сумнѣи, кою вредность траженогъ основка валя узети, едали т. е. ону маню, или можда ону веѣу одъ 90° ?

Таковы вопроса има при правоугломъ триуглу, као што уравненія §. 128. показую, свега

петъ, и мы дакле треба сада да извидимо, є ли три-
угаль у свима тима доиста неопредѣльнъ, или нїе.

§. 134.

Определяюћи

1.) изъ задате пречнище и єдне управнище
овой супротный угаль, или

2.) изъ пречнище и єдногъ угла овоме су-
протну управнищу, — имамо по уравненіама подъ
(γ , н. п. по првомъ,

$$\sin A = \frac{\sin a}{\sin d}, \text{ и } \sin a = \sin A \cdot \sin d.$$

Но по §. 132 управница a и супротный іой
угаль A мораю быти єднога истога рода. Непоз-
наты дакле основакъ єсть у оба случая извест-
нога рода, и по томе триугаль у оба случая под-
пуно опредѣльнъ.

§. 135.

Определяюћи по истимъ уравненіама

3.) изъ познате єдне управнище и супрот-
ногъ іой угла непознату пречнищу, н. п. опетъ
по првомъ, имамо

$$\sin d = \frac{\sin a}{\sin A},$$

коє уравненіе испытуюћи увиђамо, да угаль A мо-
же быти $\times 90^\circ$.

Ако є $A > 90^\circ$, онда є збогъ $A + D > 180^\circ$,
по §. 125. и $a + d > 180^\circ$; но управница є a у
томъ случаю збогъ $A > 90^\circ$ по §. 132. $> 90^\circ$; пре-

чница дакле d при томъ може бити $\geq 90^\circ$, и по
 томе триугаль у истомъ случаю неопредѣльнъ,
 развѣ α .) ако бы было $A = a$, или β .) ако е маня
 вредность пречнице $d \geq 180^\circ - a$. Ёрь у првомъ
 бы случаю было $\sin d = 1$, дакле d известно $= 90^\circ$;
 у другомъ пакъ слѣдовало бы, да е противъ усло-
 вія $a < 90^\circ$, збогъ чега у истомъ случаю пречни-
 ца d може бити само већа оъ 90° .

Ако е напротивъ $A < 90^\circ$, онда е изъ исты
 узрока као горе $a + d < 180^\circ$; пречница дакле d ,
 збогъ $a < 90^\circ$, може бити и у овомъ случаю
 $\geq 90^\circ$, и зато триугаль опетъ неопредѣльнъ, осимъ
 ако бы при томъ было α .) опетъ $A = a$, или β .)
 већа вредность пречнице $d \geq 180^\circ - a$. Ёрь у пр-
 вомъ бы случаю као и горе d было непременно
 $= 90^\circ$; у другомъ пакъ слѣдовало бы, да е управ-
 ница a противъ условію $> 90^\circ$, збогъ чега у томъ
 случаю пречница d може бити само $< 90^\circ$; дакле
 у оба ова особита случая и пречница и съ нѣомъ
 триугаль опредѣльнъ.

§. 136.

Найпосле, тражећи

4.) по уравненію подъ (δ. или ζ.
 изъ познате єднє управнице и супротногъ іой
 угла ону другу управницу, или

5.) по уравненіама подъ (θ.

изъ исты основака онай другій угаль, имамо, у-
 потребляюћи у свакомъ случаю прво уравненіє,

$$\sin b = \frac{\cot A}{\cot a} = \frac{\tan a}{\tan A}, \text{ и } \sin B = \frac{\cot A}{\cos a}.$$

У овима є вопросима триугалъ, као што лако можемо увидити, осимъ єдногъ случая, гди бы было $A = a$, и у комъ є случаю непознаты основакъ непременно $= 90^\circ$, иначе свагда неопредѣлѣнъ.

II. Разрешенѣ косоуглогъ триугла.

§. 137.

Косоуглый сферичанъ триугалъ може се разрешити, ако су познате 1.) све три нѣгове стране, 2.) две стране и заключеный угалъ, 3.) две стране и єдной супротный угалъ, 4.) єдна страна и оба на нѣой лежећа угла, 5.) два угла и єдномъ супротна страна, наипосле 6.) ако су позната сва три нѣгова угла. Разрешимо га у свакомъ одъ овы шесть случаевъ по наособѣ, оставляючи при томъ опредѣливанѣ сажая за послѣдакъ.

1.) Познате су све три стране триугла.

§. 137.

У овомъ случаю налазимо непознате угле vrlo лако помоћу образаца §. 121. подъ β .

Примера ради узмимо, да су стране триугла

$$a = 43^\circ 24' 32''$$

$$b = 50^\circ 43' 12''$$

$$d = 81^\circ 8' 14''; \text{ у томъ є случаю}$$

$$S = \frac{1}{2} (a+b+d) = \frac{1}{2} (175^\circ 15' 58'') = 87^\circ 37' 59'', \text{ дакле}$$

$$S-a = 44^\circ 13' 27'', S-b = 36^\circ 54' 47'', S-d = 6^\circ 29' 45''.$$

и зато по поменутымъ образцима

$$\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{\sin(S-b) \sin(S-d)}{\sin b \sin d}},$$

$$\sin \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{\sin(S-a) \sin(S-d)}{\sin a \sin d}},$$

$$\sin \frac{D}{2} = \sqrt{\frac{\sin(S-a) \sin(S-b)}{\sin a \sin b}};$$

$$\log \sin \frac{A}{2} = \frac{1}{2} \left\{ \begin{array}{r} 0.778455 - 1 \\ 131 \\ 0.052748 - 1 \\ 832 \\ \hline + 0.832166 - 2 \\ - 0.888755 + 1 \\ 20 \\ 0.994779 + 1 \\ 4 \\ \hline 0.948608 - 2 \\ \hline = 9.474304 \\ 115 \\ \hline 189 : 6.74 = 28 \\ 54 \end{array} \right.$$

$$\frac{A}{2} = 17^{\circ} 20' 28''$$

$$A = 34^{\circ} 40' 56''$$

$$\log \sin \frac{B}{2} = \frac{1}{2} \left\{ \begin{array}{r} 0.843465 - 1 \\ 58 \\ 0.053580 - 1 \\ + 0.897103 - 2 \\ - 0.837012 + 1 \\ 71 \\ - 0.994783 + 1 \\ 1.065237 - 2 \\ \hline = 9.532618 \\ 312 \\ \hline 306 : 5.81 = 52.6 \\ 155 \\ 39 \end{array} \right.$$

$$\frac{B}{2} = 19^\circ 55' 52.6''$$

$$B = 39^\circ 51' 45''$$

$$\log \sin \frac{D}{2} = \frac{1}{2} \left\{ \begin{array}{r} 0.843523 - 1 \\ 0.778586 - 1 \\ + 1.622109 - 2 \\ - 0.837083 + 1 \\ - 0.994783 + 1 \\ 1.790243 - 2 \\ \hline = 9.895122 \\ 045 \\ \hline 77 : 1.66 = 47 \end{array} \right.$$

$$\frac{D}{2} = 51^\circ 45' 47''$$

$$D = 103^\circ 31' 34''$$

2.) Познате су две стране a и b , и заключеный угаль D .

§. 138.

Овде определяемо найпре помоћу прве две Неперове аналогіе (§. 124. подь 7.) угле A и B а;

потомъ трећу страну d посредствомъ едне одъ познаты сразмерности §. 122. подъ (4.

$$\sin d = \frac{\sin a. \sin D}{\sin A}, \text{ или}$$

$$\sin d = \frac{\sin b. \sin D}{\sin B}.$$

Но мы исту трећу страну можемо изнаћи и непосредствено само изъ задаты основака, ако найпре у име тога еданпутъ за свагда треће уравненіе у §. 119. подъ (1., удесимо за употреблѣнїе логаритама, кое бива слѣдующимъ начиномъ.

Изъ трећегъ уравненія поменутога §. слѣдуюе

$$\cos d = \cos a. \cos b + \sin a. \sin b. \cos D$$

Додаюћи другой части овога уравненія и одузимаюћи одъ исте производъ $\sin a. \sin b$, добыямо

$$\cos d = \cos a. \cos b - \sin a. \sin b + \sin a. \sin b. \cos D + \sin a. \sin b$$

$$= \cos (a + b) + \sin a. \sin b (1 + \cos D),$$

или, збогъ $1 + \cos D = 2 \cos^2 \frac{D}{2}$ (§. 27. подъ 6.)

$$\cos d = \cos (a + b) + 2 \sin a. \sin b. \cos^2 \frac{D}{2}$$

Заменяюћи садъ далѣ $\cos d$ съ нѣговымъ вредности $2 \cos^2 \frac{d}{2} - 1$ (§. 26. подъ 5.), и уедно единицу у десну часть пребацуюћи, бытѣе

$$2 \cos^2 \frac{d}{2} = 1 + \cos(a+b) + 2 \sin a \sin b \cos^2 \frac{D}{2}$$

или, збогъ $1 + \cos(a+b) = \cos^2 \frac{1}{2}(a+b)$,

$$2 \cos^2 \frac{d}{2} = 2 \cos^2 \frac{1}{2}(a+b) + 2 \sin a \cdot \sin b \cdot \cos \frac{D}{2},$$

а съ 2 скраћуюћи

$$\begin{aligned} \cos^2 \frac{d}{2} &= \cos^2 \frac{1}{2}(a+b) + \sin a \cdot \sin b \cdot \cos^2 \frac{D}{2} \\ &= \cos^2 \frac{1}{2}(a+b) \left[1 + \frac{\sin a \cdot \sin b \cdot \cos^2 \frac{1}{2} D}{\cos^2 \frac{1}{2}(a+b)} \right] \end{aligned}$$

Найпосле поставляюћи разломакъ

$$\frac{\sin a \cdot \sin b \cdot \cos^2 \frac{1}{2} D}{\cos^2 \frac{1}{2}(a+b)} = \tan^2 \varphi \dots \dots \dots (\alpha,$$

$$\begin{aligned} \cos^2 \frac{d}{2} &= \cos^2 \frac{1}{2}(a+b) \cdot (1 + \tan^2 \varphi) \\ &= \cos^2 \frac{1}{2}(a+b) \cdot \sec^2 \varphi = \frac{\cos^2 \frac{1}{2}(a+b)}{\cos^2 \varphi} \end{aligned}$$

и одтуда

$$\cos \frac{d}{2} = \frac{\cos \frac{1}{2}(a+b)}{\cos \varphi} \dots \dots \dots (\beta.$$

Непознату дакле трећу страну d наћићемо независимо одъ други непознаты основака (углова), ако найпре уравненіемъ подъ $(\alpha$ определимо помоћный угаль φ , и нѣгову вредность после поставимо у уравненіе подъ $(\beta$.

3.) Познате су две стране a и b , и ѣдной, н. п. првой супротный угаль A .

§. 139.

У овомъ случаю определяемо найпре угле B и D ; првый соразмерношчу §а 122. подъ (4

$$\sin B : \sin A = \sin b : \sin a,$$

а другій подаюћимъ се изъ прве Неперове аналогіє (§. 124.) уравненіємъ

$$\cot \frac{D}{2} = \tan \frac{1}{2} (A+B) \frac{\cos \frac{1}{2} (a+b)}{\cos \frac{1}{2} (a-b)}$$

Имаюћи угаль D , налазимо найпосле помоћу нѣговымъ трећу страну d четвртою аналогію, изъ кое слѣдує

$$\tan \frac{d}{2} = \tan \frac{1}{2} (a+b) \frac{\cos \frac{1}{2} (A+B)}{\cos \frac{1}{2} (A-B)}$$

Иста трећа страну d и угаль D могу се знаѣти и сасвимъ независимо одъ угла B , првымъ уравненіємъ §. 119., ако найпре ово єданпутъ за свагда успособимо за употребленѣ логаритама. Коимъ начиномъ то бѣва, показатѣ мо у слѣдуюћемъ §у.

§. 140.

1.) За трећу страну d .

Изъ поменутогъ уравненія слѣдує

$$\cos a = \cos b \cdot \cos d + \sin b \cdot \sin d \cos A$$

Поставляюћи $\tan b \cdot \cos A = \tan \varphi \dots \dots (\alpha$

бытѣ $\sin b \cdot \cos A = \cos b \cdot \tan \varphi = \frac{\cos b \cdot \sin \varphi}{\cos \varphi}$, дакле

ову вредность у горнѣ уравненіє унимаюћи,

$$\cos a = \cos b \cdot \cos d + \frac{\sin b \cdot \cos b \cdot \sin \varphi}{\cos \varphi}$$

$$= \frac{\cos b}{\cos \varphi} (\cos d \cdot \cos \varphi + \sin b \cdot \sin \varphi)$$

$$= \frac{\cos b}{\cos \varphi} \cos (d - \varphi),$$

и одтуда

$$\cos (d - \varphi) = \frac{\cos a \cdot \cos \varphi}{\cos b} \dots \dots \dots (\beta).$$

2.) За угаль D .

Изъ истогъ уравненія §. 119., поставляюћи за $\cos d$ нѣгову вредность по трећемъ уравненію истога §., имамо

$$\cos A = \frac{\cos a - \cos a \cdot \cos^2 b - \sin a \cdot \sin b \cdot \cos b \cdot \cos D}{\sin b \cdot \sin d}$$

$$= \frac{\cos a (1 - \cos^2 b) - \sin a \cdot \sin b \cdot \cos b \cdot \cos D}{\sin b \cdot \sin d}$$

$$= \frac{\cos a \cdot \sin^2 b - \sin a \cdot \sin b \cdot \cos b \cdot \cos D}{\sin b \cdot \sin d},$$

или скраћуюћи са $\sin b$,

$$\cos A = \frac{\cos a \cdot \sin b - \sin a \cdot \cos b \cdot \cos D}{\sin d}$$

Заменяюћи садъ $\sin d$ нѣговомъ вредности по

§. 122., т. е. $\sin d = \frac{\sin a \cdot \sin D}{\sin A}$, слѣдуе

$$\cos A = \frac{\sin A (\cos a \cdot \sin b - \sin a \cdot \cos b \cdot \cos D)}{\sin a \cdot \sin D},$$

и одтуда, лако увиђаюћимъ се начиномъ,

$$\cot A \cdot \sin D = \cot a \cdot \sin b - \cos b \cdot \cos D.$$

Найпосле поставляюћи

$$\text{tang } A \cdot \cos b = \text{tang } \psi \dots \dots \dots (\gamma.,$$

быт'ће $\cot A = \frac{\cos b \cdot \cos \psi}{\sin \psi}$, кою вредность у пред-
ходеће уравненіе ужимаюћи слѣдуе

$$\frac{\cos b \cdot \cos \psi}{\sin \psi} \sin D = \cot a \cdot \sin b - \cos b \cdot \cos D$$

и одтуда увиђавнымъ начиномъ

$$\frac{\cos b}{\sin \psi} (\sin D \cdot \cos \psi + \cos D \cdot \sin \psi) = \cot a \cdot \sin b$$

т. е.

$$\frac{\cos b}{\sin \psi} \cdot \sin (D + \psi) = \cot a \cdot \sin b, \text{ дакле}$$

$$\sin (D + \psi) = \frac{\text{tang } b \cdot \sin \psi}{\text{tang } a} \dots \dots \dots (\delta.$$

Употреблѣнъ овы уравненія подъ α , β , γ и δ
за поменуто независимо определяванъ стране d и
угла D , увиђа се по себи безъ свакогъ дальгъ
обяснѣня.

§. 141.

Видили смо, да се у предстоѣщемъ случаю
ѣданъ угаль определюе синусомъ. Триугаль е да-
кле у истомъ случаю, збогъ наведены у §. 133
узрока, у обште сматранъ неопредѣлѣнъ; но са-
да ћемо видити, да има неки особиты вредностей
задаты основака, при којима е онай угаль, па да-
кле и цео триугаль подпуно определѣнъ.

§. 142.

Сбиръ задате две стране може быти $a + b \overline{\neq} 180^\circ$.

1.) Ако е $a + b = 180^\circ$, онда е по обштемъ свойству сферичны триуглова (§. 125.) и $A + B = 180^\circ$, и збогъ тога ако е $\angle A \begin{smallmatrix} \geq \\ \leq \end{smallmatrix} 90^\circ$, угаль B бытъ относительно $\begin{smallmatrix} \leq \\ \geq \end{smallmatrix} 90^\circ$; дакле триугаль у томъ случаю свагда определѣнь.

2.) Ако е $a + b > 180^\circ$, онда е и $A + B > 180^\circ$; зато ако буде $\angle A \begin{smallmatrix} \geq \\ \leq \end{smallmatrix} 90^\circ$, угаль B може быти само $> 90^\circ$; дакле триугаль определѣнь. Напротивъ, ако е $A > 90^\circ$, онда B може быти $\begin{smallmatrix} \geq \\ \leq \end{smallmatrix} 90^\circ$, и зато триугаль неопредѣлѣнь, осимъ ако бы была маня вредность $\angle B \leq 180^\circ - A$, у комъ случаю B може быти само $> 90^\circ$, изъ узрока: што бы маньомъ нѣговомъ вредности слѣдовало, да е $A + B$ противъ условію $< 180^\circ$. У томъ е дакле случаю триугаль опетъ определѣнь. — Найпоследѣ

3.) Ако е $a + b < 180^\circ$, онда е и $A + B < 180^\circ$, и дакле при $A \begin{smallmatrix} \geq \\ \leq \end{smallmatrix} 90^\circ$, $\angle B$ извѣстно $< 90^\circ$, и тимъ триугаль определѣнь. На противъ при $A < 90^\circ$, угаль $B \begin{smallmatrix} \geq \\ \leq \end{smallmatrix} 90^\circ$, и съ тога триугаль неопредѣлѣнь, развѣ ако е веѣна вредность вопроснога угла $B \begin{smallmatrix} \geq \\ \leq \end{smallmatrix} 180^\circ - A$, у комъ случаю B мора се узети $< 90^\circ$, еръ бы иначе испало противъ предпоставлѣню

$A + B > 180$. У томъ е дакле случаю триугаль опетъ предельнъ.

4.) Позната е една страна н. п. d , съ оба на нъой лежећа угла A и B .

§. 143.

Друге две стране a и b налазимо у овоме случаю посредствомъ треће и четврте Неперове аналогіе (§. 124), трећій пакъ угаль D добыя се по томъ сразмерносћу

$$\sin D : \sin A = \sin d : \sin a, \text{ или}$$

$$\sin D : \sin B = \sin d : \sin b;$$

но много поузданіе добыемо га, употребляюще на уравненіама подъ (α . и (β . у §. 138. свойство поларнога триугла, еръ га тимъ начиномъ определяемо независимо одъ непознаты — и можда погрешно израчунаны — страна a и b .

У име тога треба у поменутихъ уравненіама место $\sin a$, $\sin b$, $\cos \frac{D}{2}$, $\cos \frac{1}{2}(a+b)$ и $\cos \frac{d}{2}$ узети односно $\sin(180^\circ - A_1) = \sin A_1$, $\sin(180^\circ - B_1) = \sin B_1$, $\cos \frac{1}{2}(180^\circ - d_1) = \cos(90^\circ - \frac{d_1}{2}) = \sin \frac{d_1}{2}$, $\cos \frac{1}{2}(180^\circ - A_1 + 180^\circ - B_1) = \cos[180^\circ - \frac{1}{2}(A_1 + B_1)] = \sin \frac{1}{2}(A_1 + B_1)$, и $\cos \frac{1}{2}(180^\circ - D_1) = \cos(90^\circ - \frac{D_1}{2}) = \sin \frac{D_1}{2}$.

Тымъ преображаваю се иста уравненія у слѣдуюћа два

$$\operatorname{tang}^2 \varphi = \frac{\sin A_1 \cdot \sin B_1 \cdot \sin^2 \frac{1}{2} d}{\sin^2 \frac{1}{2} (A_1 + B_1)} \quad \text{и}$$

$$\sin \frac{D_1}{2} = \frac{\sin \frac{1}{2} (A_1 + B_1)}{\cos \varphi}, \quad \text{или сказальке,}$$

на познатомъ изъ §. 112. основу, изоставляюћи :

$$\operatorname{tang}^2 \varphi = \frac{\sin A \cdot \sin B \cdot \sin^2 \frac{1}{2} d}{\sin^2 \frac{1}{2} (A + B)} \dots \dots \dots (\alpha.$$

$$\sin \frac{D}{2} = \frac{\sin \frac{1}{2} (A + B)}{\cos \varphi} \dots \dots \dots (\beta.$$

5.) Позната су два угла A и B , и єдномъ н. п. првомъ супротна страна a .

§. 144.

Овде определяемо найпре другомъ углу B супротну страну b изъ сразмерности

$\sin b : \sin a = \sin B : \sin A$, а потомъ трећу страну d и трећій угаль D уравненіама

$$\operatorname{tang} \frac{d}{2} = \operatorname{tang} \frac{1}{2} (a + b) \frac{\cos \frac{1}{2} (A + B)}{\cos \frac{1}{2} (A - B)} \quad \text{и}$$

$$\cot \frac{D}{2} = \operatorname{tang} \frac{1}{2} (A + B) \frac{\cos \frac{1}{2} (a + b)}{\cos \frac{1}{2} (a - b)}, \quad \text{коя слѣ-}$$

дую односно изъ четврте и прве аналогіе. Но мы исту страну d и трећій угаль D можемо определи-ти и сасвимъ независимо одъ стране b и єдно одъ другога, и то найбіль употреблѣнїемъ поларнога триугла на уравненія трећегъ случая подъ α , β , γ и δ (§. 140.), коимъ начиномъ налазимо

1.) У име стране d по уравненіама γ и δ

$$\begin{aligned} \operatorname{tang} \psi &= \operatorname{tang} (180^\circ - a) \cos (180^\circ - B) \\ &= (-\operatorname{tang} a) \cdot (-\cos B) \\ &= \operatorname{tang} a \cdot \cos B. \dots \dots \dots (\alpha_1. \end{aligned}$$

$$\sin (180^\circ - d + \psi) = \frac{\operatorname{tang} (180^\circ - B) \cdot \sin \psi}{\operatorname{tang} (180^\circ - A)} \quad \text{т. е.}$$

$$\sin (d - \psi) = \frac{\operatorname{tang} B \cdot \sin \psi}{\operatorname{tang} A} \dots \dots \dots (\beta_1.$$

2.) у име угла D изъ уравненія подъ α и β

$$\begin{aligned} \operatorname{tang} \varphi &= \operatorname{tang} (180^\circ - B) \cdot \cos (180^\circ - a) \\ &= \operatorname{tang} B \cdot \cos a \dots \dots \dots (\gamma_1 \end{aligned}$$

$$\cos (180^\circ - D - \varphi) = \frac{\cos (180^\circ - A) \cdot \cos \varphi}{\cos (180^\circ - B)} \quad \text{т. е.}$$

$$\cos (D + \varphi) = \frac{\cos A \cdot \cos \varphi}{\cos B} \dots \dots \dots (\delta_1$$

§. 145.

И у овоме є случаю триугалъ само при некимъ особитымъ вредностима задаты углова A и B определѣнь. То є

1.) ако є $A + B = 180^\circ$, єрь у томе є случаю $a + b$ такођеръ $= 180^\circ$, и зато при $a \begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} 90^\circ$, страна b известно $\begin{matrix} \leq \\ \geq \end{matrix} 90^\circ$;

2.) ако є $A + B > 180^\circ$ и при томъ $a \begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} 90^\circ$, єрь тадь є збогъ $a + b > 180^\circ$, вопросна страна b у оба случая известно $> 90^\circ$;

3.) ако е $A + B < 180^\circ$ и при томъ $a \geq 90^\circ$; еръ онда е збогъ $a + b < 180^\circ$, страна b известно $< 90^\circ$.

На противъ неопредѣлѣнъ е

1.) Ако е $A + B > 180^\circ$ и a при томъ $> 90^\circ$; еръ тадъ страна b , као што е лако увидити, може бити $\leq 90^\circ$. Но ако бы се у томъ случаю нашло, да е маня вредность стране $b \leq 180 - a$, онда се b мора узети $> 90^\circ$, еръ бы иначе противъ условія слѣдовало да е $A + B \leq 180^\circ$. У томѣ е дакле случаю триугалъ опетъ опредѣлѣнъ.

2.) Ако е $A + B < 180^\circ$ и $a < 90^\circ$; еръ тадъ b може бити $\geq 90^\circ$. Но ако бы при томъ већа вредность одъ b была $\geq 180^\circ - a$, онда b може бити само $< 90^\circ$; еръ бы иначе слѣдовало $A + B$ противъ условія $\geq 180^\circ$; и зато е триугалъ у таковомъ случаю опетъ опредѣлѣнъ.

6.) Позната су сва три угла A , B и D .

§. 146.

У овомъ — последнѣмъ — случаю налазимо непознате стране триугла найлакше употреблѣнѣмъ поларнога триугла на образце првога случая (§. 138.), поставляюћи при томъ, да е сбиръ углова, т. е. $A + B + D = 2\Sigma$. Тако поступаюћи добывамо, сказальке при основцима поларнога триугла одна изоставляюћи,

$$S = \frac{1}{2} [180^\circ - A + 180^\circ - B + 180^\circ - D] \\ = \frac{1}{2} [3 \cdot 180^\circ - (A + B + D)] = 270^\circ - \Sigma,$$

$$S - a = 270^\circ - \Sigma - (180^\circ - A) = 90^\circ - (\Sigma - A),$$

$$S - b = 90^\circ - (\Sigma - B); S - d = 90^\circ - (\Sigma - D); \text{дакле}$$

$$\sin(S - a) = \sin[90^\circ - (\Sigma - A)] = \cos(\Sigma - A),$$

$$\sin(S - b) = \cos(\Sigma - B), \sin(S - d) = \cos(\Sigma - D), \text{ и}$$

по томе, збогъ $\sin \frac{A}{2} = \sin \frac{1}{2}(180^\circ - a) = \sin(90^\circ - \frac{a}{2}) =$
 $= \cos \frac{a}{2}, \sin \frac{B}{2} = \cos \frac{b}{2}, \sin \frac{D}{2} = \cos \frac{d}{2}, \sin a =$
 $= \sin(180^\circ - A) = \sin A, \sin b = \sin(180^\circ - B) = \sin B,$
 и $\sin d = \sin(180^\circ - D) = \sin D :$

$$\cos \frac{a}{2} = \sqrt{\frac{\cos(\Sigma - B) \cdot \cos(\Sigma - D)}{\sin B \cdot \sin D}}$$

$$\cos \frac{b}{2} = \sqrt{\frac{\cos(\Sigma - A) \cdot \cos(\Sigma - D)}{\sin A \cdot \sin D}}$$

$$\cos \frac{d}{2} = \sqrt{\frac{\cos(\Sigma - A) \cdot \cos(\Sigma - B)}{\sin A \cdot \sin B}}, \text{ съ ко-}$$

имъ образцима налазимо непознате стране триугла a, b и d .

III. Опредѣльиванѣ садржая и ексцеса сфе- ричны триуглова.

§. 147.

У §. 118. показали смо већъ, да се садржай
сф. триугла може определити сувишкомъ нѣговы

углова надъ два права угла. Сада пакъ показатѣмо іошъ, како се налази 1.) изъ две стране и заключеногъ угла, и 2.) помоћу самы страна, при мећаваюћи: да се може определити и другимъ основцима, но да су образци у свима другимъ случаевима, особито кадъ бы се удесили за употребѣнѣ логаритама, тако замршени, да є свагда пробитачніє изнаћи га єднымъ одъ поменути три начина, и ако бы се нуждни основци зато топрвъ морали израчунати.

1.) Рачунаѣ садржая посредствомъ две стране и заключеногъ угла.

§. 148.

Сматраюћи правый угаль као єдиницу или меру углова, а осму часть сферичногъ површія као єдиницу површыны частій сфере имамо по пређе поменутомъ §., означуюћи при томъ садржай триугла съ T , а нѣгове угле съ A , B и D :

$$T = (A + B + D)^{\circ} - 180^{\circ}, \text{ и одтуда}$$

$$\frac{1}{2} (A + B + D) = 90^{\circ} - \frac{1}{2} T$$

дакле

$$\text{tang } \frac{1}{2} (A + B + D) = \text{tang } (90^{\circ} - \frac{1}{2} T) = -\cot \frac{1}{2} T$$

Но по §. є 22. (обр. прв. подъ V.)

$$\begin{aligned} \text{tang } \frac{1}{2} (A + B + D) &= \text{tang } \left[\frac{1}{2} (A + B) + \frac{1}{2} D \right] \\ &= \frac{\text{tang } \frac{1}{2} (A + B) + \text{tang } \frac{1}{2} D}{1 - \text{tang } \frac{1}{2} (A + B) \cdot \text{tang } \frac{1}{2} D}; \end{aligned}$$

зато

$$-\cot \frac{1}{2} T = \frac{\text{tang } \frac{1}{2} (A + B) + \text{tang } \frac{1}{2} D}{1 - \text{tang } \frac{1}{2} (A + B) \cdot \text{tang } \frac{1}{2} D},$$

или, место $\tan \frac{1}{2}(A+B)$ нѣну вредность по первой неперовой аналогій ужимаючи,

$$\begin{aligned} -\cot \frac{1}{2} T &= \frac{\cos \frac{1}{2}(a-b) \cot \frac{1}{2} D + \cos \frac{1}{2}(a+b) \tan \frac{1}{2} D}{\cos \frac{1}{2}(a+b) - \cos \frac{1}{2}(a-b)} \\ &= \frac{\cos \frac{1}{2}(a-b) + \cos \frac{1}{2}(a+b) \tan^2 \frac{1}{2} D}{\left[\cos \frac{1}{2}(a+b) - \cos \frac{1}{2}(a-b) \right] \tan \frac{1}{2} D} \end{aligned}$$

Развѣяючи у овоме изразу $\cos \frac{1}{2}(a-b)$ и $\cos \frac{1}{2}(a+b)$ као косинусе разлике и збира два угла $\frac{a}{2}$ и $\frac{b}{2}$, и при томъ общте чинителѣ извлечеѣи слѣдуе даль

$$\begin{aligned} -\cot \frac{1}{2} T &= \\ &= \frac{\cos \frac{a}{2} \cos \frac{b}{2} (1 + \tan^2 \frac{D}{2}) + \sin \frac{a}{2} \sin \frac{b}{2} (1 - \tan^2 \frac{D}{2})}{-2 \sin \frac{a}{2} \sin \frac{b}{2} \tan \frac{D}{2}} \end{aligned}$$

или, место $\tan \frac{D}{2}$ нѣну вредность $\frac{\sin \frac{1}{2} D}{\cos \frac{1}{2} D}$ уводеѣи

$$\begin{aligned} \cot \frac{1}{2} T &= \frac{\cos \frac{a}{2} \cos \frac{b}{2} + \sin \frac{a}{2} \sin \frac{b}{2} (\cos^2 \frac{D}{2} - \sin^2 \frac{D}{2})}{2 \sin \frac{a}{2} \sin \frac{b}{2} \sin \frac{D}{2} \cos \frac{D}{2}} \\ &= \frac{\cos \frac{a}{2} \cos \frac{b}{2} + \sin \frac{a}{2} \sin \frac{b}{2} (\cos^2 \frac{D}{2} - \sin^2 \frac{D}{2})}{\sin \frac{a}{2} \sin \frac{b}{2} \sin D} \\ &= \frac{\cot \frac{a}{2} \cot \frac{b}{2} + \cos^2 \frac{D}{2} - \sin^2 \frac{D}{2}}{\sin D} \end{aligned}$$

Найпосле збогъ $\cos^2 \frac{D}{2} = \frac{1 + \cos D}{2}$, а $\sin^2 \frac{D}{2} = \frac{1 - \cos D}{2}$ (сл. 27.), дакле $\cos^2 \frac{D}{2} - \sin^2 \frac{D}{2} = \cos D$:

$$\cot \frac{1}{2} T = \frac{\cot \frac{1}{2} a \cot \frac{1}{2} b + \cos D}{\sin D} \dots \dots (I.$$

уравненіе, у комъ е као што видимо израженъ садржай сф. триугла посредствомъ две нѣгове стране a и b , и истымъ странама заключеногъ угла D .

Ово уравненіе удешава се за употреблѣнїе логаритама врло лако слѣдующимъ начиномъ:

Делећи у десной части съ $\sin D$ слѣдуе

$$\cot \frac{1}{2} T = \frac{\cot \frac{1}{2} a \cot \frac{1}{2} b}{\sin D} + \cot D ;$$

поставляюћи садъ разломакъ

$$\frac{\cot \frac{1}{2} a \cot \frac{1}{2} b}{\sin D} = \cot \varphi \dots \dots \dots (\alpha.$$

поставе по §. 24. (др. обр. подъ 2.) десна часть уравненія $\cot \varphi + \cot D = \frac{\sin (D + \varphi)}{\sin D \cdot \sin \varphi}$, тако да е по томе

$$\cot \frac{1}{2} T = \frac{\sin (D + \varphi)}{\sin D \cdot \sin \varphi} \dots \dots \dots (\beta.$$

2.) Опредѣляванїе сажая посредствомъ самы страна'.

§. 149.

На основу горнѣгъ уравненія подъ (1) имамо

$$1 + \cot^2 \frac{1}{2} T = 1 + \frac{\cot^2 \frac{a}{2} \cot^2 \frac{b}{2} + \cos^2 D + 2 \cot \frac{a}{2} \cot \frac{b}{2} \cos D}{\sin^2 D}$$

т. е.

$$\operatorname{cosec}^2 \frac{1}{2} T = \frac{1 + \cot^2 \frac{a}{2} \cot^2 \frac{b}{2} + 2 \cot \frac{a}{2} \cot \frac{b}{2} \cos D}{\sin^2 D}$$

и отсюда, место $\operatorname{cosec} \frac{1}{2} T$ нѣну вредность $\frac{1}{\sin \frac{1}{2} T}$ унимаючи и потомъ обе части уравненія преврѣхуи,

$$\alpha.) \dots \sin^2 \frac{1}{2} T = \frac{\sin^2 D}{1 + \cot^2 \frac{a}{2} \cot^2 \frac{b}{2} + 2 \cot \frac{a}{2} \cot \frac{b}{2} \cos D}$$

$$\text{Уведећи у изразу } \cos D = \frac{\cos d - \cos a \cdot \cos b}{\sin a \cdot \sin b}$$

(§. 119.) место a , b и d полуугле, налазимо

$$\cos D = \frac{1 - 2 \sin^2 \frac{d}{2} - (1 - 2 \sin^2 \frac{a}{2})(1 - 2 \sin^2 \frac{b}{2})}{2 \sin \frac{a}{2} \cos \frac{a}{2} \cdot 2 \sin \frac{b}{2} \cos \frac{b}{2}}$$

$$= \frac{\sin^2 \frac{a}{2} + \sin^2 \frac{b}{2} - \sin^2 \frac{d}{2} - 2 \sin^2 \frac{a}{2} \sin^2 \frac{b}{2}}{2 \sin \frac{a}{2} \cos \frac{a}{2} \sin \frac{b}{2} \cos \frac{b}{2}}$$

$$= \frac{\sin^2 \frac{a}{2} + \sin^2 \frac{b}{2} - \sin^2 \frac{d}{2}}{2 \sin \frac{a}{2} \cos \frac{a}{2} \sin \frac{b}{2} \cos \frac{b}{2}} - \operatorname{tang} \frac{a}{2} \operatorname{tang} \frac{b}{2},$$

ово пакъ уравненіє съ $2 \cot \frac{a}{2} \cdot \cot \frac{b}{2}$ мложеѣи

$$\beta.) \dots 2 \cot \frac{a}{2} \cdot \cot \frac{b}{2} \cos D = \frac{\sin^2 \frac{a}{2} + \sin^2 \frac{b}{2} - \sin^2 \frac{d}{2}}{\sin^2 \frac{a}{2} \cdot \sin^2 \frac{b}{2}} - 2$$

Изражаваюѣи іошъ у производу $\cot \frac{a}{2} \cdot \cot \frac{b}{2}$
оба чинителя синусима, имамо

$$\cot \frac{a}{2} \cdot \cot \frac{b}{2} = \frac{\sqrt{(1 - \sin^2 \frac{a}{2})(1 - \sin^2 \frac{b}{2})}}{\sin \frac{a}{2} \cdot \sin \frac{b}{2}}, \quad \text{и}$$

одтуда

$$\cot^2 \frac{a}{2} \cdot \cot^2 \frac{b}{2} = \frac{(1 - \sin^2 \frac{a}{2})(1 - \sin^2 \frac{b}{2})}{\sin^2 \frac{a}{2} \sin^2 \frac{b}{2}},$$

или мложеѣи и скраћуюѣи

$$\gamma.) \dots \cot^2 \frac{a}{2} \cdot \cot^2 \frac{b}{2} = \frac{1 - \sin^2 \frac{a}{2} - \sin^2 \frac{b}{2}}{\sin^2 \frac{a}{2} \cdot \sin^2 \frac{b}{2}} + 1$$

Дакле, место дотичны чланова у именителю
уравненія подъ $\alpha.)$ ове нѣіове вредности узимаюѣи
и потомъ што є могуѣе скраћуюѣи

$$\sin^2 \frac{1}{2} T = \frac{\sin^2 D \cdot \sin^2 \frac{a}{2} \cdot \sin^2 \frac{b}{2}}{1 - \sin^2 \frac{d}{2}}$$

$$= \frac{\sin^2 D \cdot \sin^2 \frac{a}{2} \cdot \sin^2 \frac{b}{2}}{\cos^2 \frac{d}{2}}, \text{ и отсюда}$$

$$\delta.) \dots \sin \frac{1}{2} T = \frac{\sin D \cdot \sin \frac{a}{2} \cdot \sin \frac{b}{2}}{\cos \frac{d}{2}}$$

Найпосле у овомъ уравненію 1^о., $\sin D$ полу-
угломъ изражаваюћи, потомъ 2^о.) место $\sin \frac{1}{2} D$ и
 $\cos \frac{1}{2} D$ нѣюве вредности по §. 121. ужимаюћи, и 3.)
іошъ тѣмѣ появлююће се синусе одъ a и b полу-
углима определяюћи — слѣдѹе самимъ странама
израженный садржай триугла

$$\sin \frac{1}{2} T = \frac{\sqrt{\sin S \cdot \sin(S-a) \cdot \sin(S-b) \cdot \sin(S-d)}}{2 \cos \frac{a}{2} \cdot \cos \frac{b}{2} \cdot \cos \frac{d}{2}}. \text{ (II.)}$$

§. 150.

Симонъ Люйліе — *Lhuillier* — поставіо е за
садржай сф. триугла, определѣнь самимъ нѣговымъ
странама, слѣдуюћій, колико веома лепъ, толико
и врло удесанъ образацъ

$$\operatorname{tg} \frac{1}{4} T = \sqrt{\operatorname{tg} \frac{1}{2} S \cdot \operatorname{tg} \frac{1}{2} (S-a) \cdot \operatorname{tg} \frac{1}{2} (S-b) \cdot \operatorname{tg} \frac{1}{2} (S-d)} \dots \text{ (III.)}$$

кои находимо найлакше овако :

Мложећи уравненіе преѣашнѣгъ §. подъ (δ. съ
онимъ подъ I. у §. 148. слѣдѹе

$$\cos \frac{1}{2} T = (\cot \frac{a}{2} \cdot \cot \frac{b}{2} + \cos D) \cdot \frac{\sin \frac{a}{2} \sin \frac{b}{2}}{\cos \frac{d}{2}}$$

Но по §. 30. (обр. подъ 17.)

$$\cot \frac{a}{2} = \frac{1 + \cos a}{\sin a}, \text{ а } \cot \frac{b}{2} = \frac{1 + \cos b}{\sin b}; \text{ дакле}$$

$$\cot \frac{a}{2} \cot \frac{b}{2} = \frac{(1 + \cos a)(1 + \cos b)}{\sin a \cdot \sin b}.$$

По §. пакъ 119. имамо

$$\cos D = \frac{\cos d - \cos a \cdot \cos b}{\sin a \cdot \sin b}. \text{ Слѣдовател-}$$

но ово уравненіе предходе́емъ додаю́ћи

$$\begin{aligned} \cot \frac{a}{2} \cot \frac{b}{2} + \cos D &= \frac{(1 + \cos a)(1 + \cos b) + \cos d - \cos a \cdot \cos b}{\sin a \cdot \sin b} \\ &= \frac{1 + \cos a + \cos b + \cos d}{\sin a \cdot \sin b}, \text{ и зато,} \end{aligned}$$

ову вредность у прво уравненіе поставляю́ћи

$$\cos \frac{1}{2} T = \frac{(1 + \cos a + \cos b + \cos d) \cdot \sin \frac{a}{2} \cdot \sin \frac{b}{2}}{\sin a \cdot \sin b \cdot \cos \frac{d}{2}},$$

или ако овде функціи целы страна полустранама изразимо и потомъ скратимо

$$\varepsilon.) \dots \cos \frac{1}{2} T = \frac{\cos^2 \frac{a}{2} + \cos^2 \frac{b}{2} + \cos^2 \frac{d}{2} - 1}{2 \cos \frac{a}{2} \cos \frac{b}{2} \cos \frac{d}{2}}$$

Одужимаюћи садъ ово уравненіе одъ единице и разлику потомъ съ уравненіемъ подъ II. (§. 149.) делећи слѣдує збогъ $\frac{1 - \cos \frac{1}{2} T}{\sin \frac{1}{2} T} = \operatorname{tang} \frac{1}{2} T$ (§. 30.)

$$\begin{aligned} 2 \cos \frac{a}{2} \cos \frac{b}{2} \cos \frac{d}{2} - \cos^2 \frac{a}{2} - \cos^2 \frac{b}{2} - \\ - \cos^2 \frac{d}{2} + 1 \\ (\zeta \dots \operatorname{tang} \frac{1}{2} T = \frac{\sqrt{\sin S \cdot \sin(S-a) \cdot \sin(S-b) \sin(S-d)}}{\end{aligned}$$

Означуюћи броителя овогъ израза за дальй посао краіине ради съ N , имамо

$$\begin{aligned} N &= 2 \cos \frac{a}{2} \cos \frac{b}{2} \cos \frac{d}{2} - \cos^2 \frac{a}{2} - \cos^2 \frac{b}{2} - \cos^2 \frac{d}{2} + 1 \\ &= (\sin \frac{a}{2} \sin \frac{d}{2} + \cos \frac{b}{2} - \cos \frac{a}{2} \cos \frac{d}{2}) \cdot (\sin \frac{a}{2} \sin \frac{d}{2} - \\ &\quad - \cos \frac{b}{2} + \cos \frac{a}{2} \cos \frac{d}{2}) \\ &= \left[\cos \frac{b}{2} - \cos \frac{1}{2}(a+d) \right] \cdot \left[\cos \frac{1}{2}(a-d) - \cos \frac{b}{2} \right], \text{ или} \end{aligned}$$

по §. 23. (посл. обр. подъ 1.)

$$N = 4 \sin \frac{1}{4}(a+b+d) \sin \frac{1}{4}(a+d-b) \sin \frac{1}{4}(a+b-d) \sin \frac{1}{4}(b+d-a)$$

т. е. збогъ $a+b+d=2S$

$$N = 4 \sin \frac{1}{2} S \sin \frac{1}{2}(S-b) \sin \frac{1}{2}(S-d) \sin \frac{1}{2}(S-a), \text{ и}$$

дакле, ову вредность броителя у горнѣ уравненіе поставляюћи

$$\operatorname{tang} \frac{1}{4} T = \frac{4 \sin \frac{1}{2} S \cdot \sin \frac{1}{2} (S-a) \cdot \sin \frac{1}{2} (S-b) \cdot \sin \frac{1}{2} (S-d)}{\sqrt{\sin S \cdot \sin (S-a) \cdot \sin (S-b) \cdot \sin (S-d)}},$$

$$\begin{aligned} \text{или, збогъ } \frac{\sin \frac{1}{2} S}{\sqrt{\sin S}} &= \sqrt{\frac{\sin^2 \frac{1}{2} S}{\sin S}} = \sqrt{\frac{\sin^2 \frac{1}{2} S}{2 \sin \frac{1}{2} S \cos \frac{1}{2} S}} = \\ &= \sqrt{\frac{\sin \frac{1}{2} S}{2 \cos \frac{1}{2} S}} = \sqrt{\frac{1}{2} \operatorname{tang} \frac{1}{2} S}, \end{aligned}$$

$$\frac{\sin \frac{1}{2} (S-a)}{\sqrt{\sin (S-a)}} = \sqrt{\frac{1}{2} \operatorname{tang} (S-a)}$$

и т. д.

$$\begin{aligned} \operatorname{tang} \frac{1}{4} T &= 4 \sqrt{\left[\frac{1}{2} \operatorname{tang} \frac{1}{2} S \cdot \frac{1}{2} \operatorname{tang} \frac{1}{2} (S-a) \cdot \frac{1}{2} \operatorname{tang} \frac{1}{2} (S-b) \right.} \\ &\quad \left. \frac{1}{2} \operatorname{tang} \frac{1}{2} (S-d) \right] \\ &= \sqrt{\operatorname{tang} \frac{1}{2} S \cdot \operatorname{tang} (S-a) \cdot \operatorname{tang} \frac{1}{2} (S-b) \cdot \operatorname{tang} \frac{1}{2} (S-d)} \end{aligned}$$

Людліковъ образаць као што смо га горе навели.

3.) Опредѣляванѣ сферичногъ эксцеса.

§. 151.

Видили смо у §. 118., да се садржай сферичногъ триугла може определити сувишкомъ нѣгову угла надъ 180° , или тако званымъ эксцесомъ. Сада пакъ, почемъ знамо, како се іошъ и другимъ начиномъ налази, да извидимо, како бы на основу поменутогъ §. обратно изъ познатогъ садржая определили непознатый эксцесъ.

Означуюћи у име тога вопросный эксцесъ, т. е. разлику $(A + B + D)^\circ - 180^\circ$ съ E , садржай триугла съ T , полупречникъ сфере съ r , а нѣно површіе съ S : имамо по реченомъ §.

$$T = \frac{S}{8} \cdot \frac{E^0}{90^0} = \frac{S}{4} \cdot \frac{E^0}{180^0}, \text{ и одтуда експецъ}$$

у степенима

$$E^0 = T \cdot 180^0 \cdot \frac{4}{S},$$

или збогъ $S = 4 r^2 \pi \dots$ (стереометрія)

$$E^0 = \frac{T \cdot 180^0}{r^2 \pi} \dots \dots \dots (I.$$

Изражавајући га пакъ у секундама быт'ће

$$E'' = \frac{T}{r^2} \cdot \frac{180 \cdot 60 \cdot 60''}{\pi},$$

или, изъ узрока што є по §. 54. $\frac{180 \cdot 60 \cdot 60''}{\pi} = \varrho''$,
при чему ϱ'' означує у секундама израженный лукъ
дужине равне полупречнику,

$$E'' = \frac{T}{r^2} \cdot \varrho'' \dots \dots \dots (II.$$

Найпосле іошъ збогъ $\varrho'' = \frac{1}{\sin 1''}$ по истомъ §.

$$E'' = \frac{T}{r^2 \sin 1''} \dots \dots \dots (III.$$

Приметба. У свыма овима изразима експеса треба
да в полупречникъ сфере r ономъ истомъ едини-
цомъ израженъ, коіомъ су стране тругла у нѣго-
вомъ садржаю T .

§. 152.

Изъ горнѣгъ уравненія подъ II. слѣдує

$$\log E'' = \log T + \log \varrho'' - 2 \log r.$$

Узимаюћи да є средній полупречникъ наше землѣ $r = 6366678$ метра, имамо дакле за веће триугле на нѣномъ површію, обзиромъ на §. 54., по комъ є $\varrho'' = 206265''$:

$$\begin{aligned} \log E'' &= \log T + 5.314425 - 13.607826 \\ &= \log T - 8.293401 \end{aligned}$$

то ће рећи: Логаритамъ у секундама израженогъ эксцеса свакогъ већегъ триугла на површію землѣ добыямо, ако одъ логаритма у метрима израженогъ нѣговогогъ садржая одузмемо сталный брой 8.293401.

§. 153.

Определьиванѣ є сферичногъ эксцеса особи-то при тригонометричномъ премераваню одъ врло велике ползе, ерѣ се посредствомъ нѣга можемо уверити о точности определѣны при томъ нуждны углова. Примера и већега обясненя ради испытаймо у томъ смислу слѣдуюћій случай:

При тригонометричномъ некомъ премераваню нашли смо, да су на горизонтъ пренешени угли (види слѣдуюћій §.) триугла ABD

$$A = 42^\circ 2' 32''$$

$$B = 67^\circ 55' 39''$$

$$D = 70^\circ 1' 48'', \text{ дакле}$$

$$A+B+D = 179^\circ 59' 59'', \text{ а две нѣгове стране } b = 7530^m, d = 11723^m.$$

У томъ є случаю збогъ $T = \frac{1}{2} bd. \sin A$ (§. 76.)

$$\log T = \left\{ \begin{array}{l} 3.876795 \dots \dots \dots \log b \\ 4.069041 \dots \dots \dots \log d \\ 0.825861 - 1 \dots \dots \dots \log \sin A \\ + 7.771697 \\ - 0.301030 \dots \dots \dots \log 2 \end{array} \right.$$

7.470667, одтудъ пакъ по предходеhemъ §. брой 8.293401 одбіаюћи:

$$\log E'' = 0.177266 - 1, \text{ дакле}$$

$$E'' = 0''.15, \text{ т. є. сбиръ угла у томъ}$$

случаю треба да є $180^\circ 0' 0''.15$, дакле у $1''.15$ већій, него што смо га нашли, и зато угле вопроснога триугла овомъ разликомъ поправити треба. Ако смо уверени, да смо сва три угла еднакомъ точности определили: онда ћемо свакомъ додати

$$\frac{1''.15}{3} = 0''.38; \text{ у противномъ пакъ случаю увећатъ}$$

ћемо съ надлежномъ части нађене разлике $\left(\frac{1''.15}{2}\right.$

или $\frac{1''.15}{1})$ само оне, о којима имамо узрока сумняти се.

В.) Разрешенъ два важна геодегична задатка.

1. Пренашанъ угла на хоризонтъ.

§. 154.

Подъ пренашанъмъ или редукиомъ угла на хоризонтъ разумева се разрешенъ задатка: изъ познатогъ, према хоризонту неке точке O косо лежећегъ угла MON , (сл. 29.) изнаћи посредствомъ

управны на истый горизонтъ угла $MOm = \alpha$ и $NOn = \beta$, горизонтальный угаль $\mu\nu = x$. (*)

При овоме задатку могућа су свега три случая : 1.) точке M и N , на кое се угаль сматрао изъ O , есу обе надъ горизонтомъ ове точке ; или 2.) една е, н. п. M надъ нѣмъ а она друга у N подъ нѣмъ ; или наипосле 3.) оне су обе у M и N подъ истымъ горизонтомъ. Мы ћемо овде особито сматрати само првый случай, изъ узрока, што се изъ образца тога случая они за остала два, врло лако добыяю само надлежномъ пременомъ знака угла α и β .

§. 155.

сл. 29.

Полажући по крацима угла MON (сл. 29.) два на горизонтъ точке O управна, у падной ZO пресецаюћа се найвећа окружія, и повлачећи потомъ іошъ найвеће лукове mn и $\mu\nu$: бытће $Z\mu$ и $Z\nu$ свакій $= 90^\circ$, и зато по §. 107. $\angle x = Z = \mu\nu$. Одъ сферичногъ дакле триугла Zmn познате су све три стране $mn = \varphi$, $mZ = 90^\circ - \alpha = a$, и $nZ = 90^\circ - \beta = b$; тражи се пакъ нѣговъ угаль $Z = \mu\nu = x$.

Поставляюћи у име тога у два последня образца §. 121. подъ 3. $\angle D = x$, страну пакъ $d = \varphi$ имамо

$$\cos \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{\sin S. \sin (S - \varphi)}{\sin a. \sin b}}, \text{ или}$$

*) Овай задатакъ може се разрешити и равномъ тригонометріомъ (види „Adam Burgs Handbuch der ebenen und sphärischen Trigonometrie. Wien 1826. §. 61. IV. Ausgabe.“); но много лакше и простіе е нѣгово разрешеніе на основу сферичне тригонометріе начинаемъ, као што ћемо одма видети.

$$\sin \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{\sin(S-a) \cdot \sin(S-b)}{\sin a \cdot \sin b}},$$

при чому є по горньому $a = 90^\circ - \alpha$, $b = 90^\circ - \beta$,
 $S = \frac{1}{2}(a + b + \varphi) = \frac{1}{2}[180^\circ - (\alpha + \beta - \varphi)] = 90^\circ - \frac{1}{2}(\alpha + \beta - \varphi)$, дакле

$$\sin a = \sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha, \quad \sin b = \sin(90^\circ - \beta) = \cos \beta,$$

$$\sin S = \sin\left[90^\circ - \frac{1}{2}(\alpha + \beta - \varphi)\right] = \cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta - \varphi),$$

$$\begin{aligned} \sin(S-a) &= \sin\left[90^\circ - \frac{1}{2}(\alpha + \beta - \varphi) - (90^\circ - \alpha)\right] \\ &= \sin \frac{1}{2}(\alpha + \varphi - \beta), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin(S-b) &= \sin\left[90^\circ - \frac{1}{2}(\alpha + \beta - \varphi) - (90^\circ - \beta)\right] \\ &= \sin \frac{1}{2}(\beta + \varphi - \alpha), \text{ найпосле} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin(S-\varphi) &= \sin\left[90^\circ - \frac{1}{2}(\alpha + \beta - \varphi) - \varphi\right] \\ &= \sin\left[90^\circ - \frac{1}{2}(\alpha + \beta + \varphi)\right] = \cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta + \varphi); \end{aligned}$$

и по тому у име вопроснога, т. є. на горизонтъ пренешеногъ угла у првомъ случаю,

$$1.) \quad \cos \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{\cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta + \varphi) \cdot \cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta - \varphi)}{\cos \alpha \cdot \cos \beta}}$$

$$\text{или } 2.) \quad \sin \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{\sin \frac{1}{2}(\varphi + \alpha - \beta) \cdot \sin \frac{1}{2}(\varphi + \beta - \alpha)}{\cos \alpha \cdot \cos \beta}}$$

§. 156.

У другомъ случаю, т. є. у случаю, гди єдна одъ сматраны точкй, н. п. N , лежи подъ горизонтомъ точке O у точки N' , треба угаль β (у сл. β') у овыха образцима, збогъ нѣговогъ, углу α према поменутомъ горизонту противногъ положеня, узети одрицателанъ. У трећемъ пакъ и послед-

нѣмъ случаю узетѣе се изъ истога узрока оба угла α и β , или у сд. α' и β' , одрицателни.

§. 157.

Упражненія ради наводимо слѣдуюћій примеръ. При предузетомъ у години 1787. тригонометричномъ премеравању у име саюжена звездарнице у Гриничу (*Greenwich*) съ ономъ у Паризу, наѣнъ е у Кале-у (*Calais*) сматраный коссій угаль између Фиенна — *Fiennes* — и Ватна (*Watten*), $\varphi = 66^\circ 30' 38''$, управни пакъ угли были су $\alpha = 0^\circ 25' 47''$, и $\beta = -1''$.

Овай дакле примеръ принадлежи збогъ одрицателнога угла β другомъ случаю, и мы по томе имамо у име тражећегъ се хоризонталнога угла x по првомъ образцу $\frac{1}{2}(\alpha + \beta + \varphi) = 33^\circ 28' 12''$

$$\frac{1}{2}(\alpha + \beta - \varphi) = -33^\circ 2' 26''$$

$$\log \cos \frac{x}{2} = \frac{1}{2} \left\{ \begin{array}{r} 9.921274 \\ 9.923427 \\ \hline 19.844701 \\ 9.999988 \\ \hline 34 \\ 9.844679 \\ 0.844679 - 1 \\ 0.922339 - 1 \\ \hline 9.922339 \end{array} \right. , \text{ дакле}$$

$$\frac{272}{67 : 138} = 48.55$$

$$\frac{x}{2} = 33^\circ 15' 11''$$

$$x = 66^\circ 30' 22'' , \text{ и по томе}$$

разлика међу сматранимъ коссимъ и хоризонтал-
нымъ угломъ $\varphi - x = 16''$

II. Пренашанъ сферичногъ угла на тетивке.

§. 158.

Пренашанъ сферичногъ угла на тетивке —
редукціомъ на корде — означае се определяванъ
угла MON , (сл. 30.) образованогъ тетивкама одъ
две стране a и b сфер. некогъ триугла MON .

Ако повучемо по точки O дирке на краке a и
 b сфер. угла MON , равница истымъ диркама mO и
 nO определѣна, быће хоризонтъ точке O , а угаль
 $mOn = x$ раванъ сфер. углу MON . Тетивачный
угаль дакле MON появлюе се као подъ хоризон-
томъ овога лежећий, и мы га по томе можемо из-
наћи преврћући образце пређашнѣгъ задатка у
трећемъ случаю.

§. 159.

Поставляюћи у име тога найпре у првомъ о-
бразцу §. 155. место α и β као што треба $(-\alpha)$ и
 $(-\beta)$ добыямо

$$\cos \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{\cos \frac{1}{2}[\varphi - (\alpha + \beta)] \cdot \cos \frac{1}{2}(\varphi + \alpha + \beta)}{\cos \alpha \cdot \cos \beta}}$$

или подижући цело уравненіе на квадратъ и при-
томъ другу часть одъ имениателя ослобођаваюћи

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta \cdot \cos \frac{x}{2} = \cos \frac{1}{2}[\varphi - (\alpha + \beta)] \cdot \cos \frac{1}{2}[\varphi + (\alpha + \beta)]$$

Изражаваюћи сада оба чинителя десне части

по другимъ образцамъ §§. 19. и 20. подъ II. и IV. слѣдую

$$\begin{aligned}
 \cos \alpha \cdot \cos \beta \cdot \cos \frac{x}{2} &= \left[\cos \frac{\varphi}{2} \cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta) + \sin \frac{\varphi}{2} \sin \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \right] \times \\
 &\quad \times \left[\cos \frac{\varphi}{2} \cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta) - \sin \frac{\varphi}{2} \sin \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \right] \\
 &= \cos^2 \frac{\varphi}{2} \cos^2 \frac{1}{2}(\alpha + \beta) - \sin^2 \frac{\varphi}{2} \sin^2 \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \\
 &= \cos^2 \frac{\varphi}{2} \cos^2 \frac{1}{2}(\alpha + \beta) - (1 - \cos^2 \frac{\varphi}{2}) \times \\
 &\quad \sin^2 \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \\
 &= \cos^2 \frac{\varphi}{2} \left[\cos^2 \frac{1}{2}(\alpha + \beta) + \sin^2 \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \right] - \\
 &\quad - \sin^2 \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \\
 &= \cos^2 \frac{\varphi}{2} - \sin^2 \frac{1}{2}(\alpha + \beta), \text{ и отсюда}
 \end{aligned}$$

$$\cos^2 \frac{\varphi}{2} = \cos \alpha \cdot \cos \beta \cdot \cos \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{1}{2}(\alpha + \beta)$$

Но углы $\alpha = \frac{a}{2}$, а $\beta = \frac{b}{2}$, као углы образовани диркомъ и тетивкомъ (геом.); зато

$$\cos^2 \frac{\varphi}{2} = \cos \frac{a}{2} \cdot \cos \frac{b}{2} \cdot \cos \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{1}{4}(a + b),$$

коимъ φ уравненіемъ, као што видимо, вопросный т. е. на тетивке пренесенный уголъ φ определѣнъ.

§. 160.

Да бы овай изразъ удесили за пробитачніи računъ съ логаритмима, то извучимо найпре $\sin^2 \frac{1}{4}(a + b)$ као общегъ чинителя; бытъ же

$$\cos^2 \frac{\varphi}{2} = \sin^2 \frac{1}{4}(a + b) \left[1 + \frac{\cos \frac{a}{2} \cdot \cos \frac{b}{2} \cdot \cos \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{1}{4}(a + b)} \right]$$

сада пакъ разломакъ

$$\frac{\cos \frac{a}{2} \cdot \cos \frac{b}{2} \cos^2 \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{1}{4}(a+b)} = \tan^2 \omega$$

поставляюћи :

$$\begin{aligned} \cos^2 \frac{\varphi}{2} &= \sin^2 \frac{1}{4}(a+b) \cdot (1 + \tan^2 \omega) \\ &= \sin^2 \frac{1}{4}(a+b) \cdot \sec^2 \omega \\ &= \frac{\sin^2 \frac{1}{4}(a+b)}{\cos^2 \omega} ; \text{ и одтуда за логаритмично } \end{aligned}$$

ритмично опредѣляванъ тетивачногъ угла, почему смо найпре предходеѣмъ уравненіемъ изнашли помощный угаль ω :

$$\cos \frac{\varphi}{2} = \frac{\sin \frac{1}{4}(a+b)}{\cos \omega}.$$



ОСОБИТЫЙ ДОДАТАКЪ.

Die Liebe zu den Gegenständen erhält erst
einzig durch die zunehmende Kenntniß von
denselben ihre wahre Unererschöpflichkeit.

Wagner.

Велику ползу и занимљивость тригонометріе увиђаюћимъ, и тога ради съ истомъ наукомъ већма упознати се желећимъ моимъ ученицима, препоручуемъ на концу овогъ могъ, за ту нѣову похвалну намеру безъ сумнѣ недостижућегъ дела слѣдуюћа, мени као врстна позната већа дела.

Adam Burg, Handbuch der geradlinigen und sphärischen Trigonometrie. Wien 1826.

Lacroix S. F., traité élémentaire de trigonométrie rectiligne et sphérique etc. Paris 1852.

Müller W., analytische Entwicklung der Trigonometrie. Göttingen 1806.

Ozanam, la trigonométrie rectiligne et sphérique. Paris 1741.

Rivard, trigon. rectil. et sphér. Paris 1750.

Voch, Theorie und Praxis der Trigonometrie. Augsburg 1779.

Zimmermann, sphärische Trigonometrie. Berlin 1800.

Belanger J. B., Grundlehren der ebenen Trigonometrie, analyt. Geometrie etc. etc., deutsch von Dr. Bernh. Gugler Stuttgart 1847.

Köcher, ebene Trigonometrie und Polygonometrie. Leipzig 1821.

Meyer J. Tob., tetragonometriae specimen I. Göttingen 1773.

L'Huilier S., Polygonométrie, ou de la mesure des figures rectiligne etc. etc. Genève et Paris 1789.




Поправке знаменити погрешака.

На стр.	у врсти	место	треба
6.	3. и 10. одозго	положителне и одрицателне	положителни и одрицателни
7.	6. одозго	$\operatorname{cosec} = \infty$	$\operatorname{cosec} 0 = \infty$
8.	6. одоздо	$= r$	$= -r$
11.	5. одозго	$\sin. u. 360_0$	$\sin. v. 360^0$
11.	6. "	пололеню	положеню
12.	7. "	полотеланъ	положителанъ
12.	6. "	$(\frac{1}{2} \pi \pm \varphi)$	$(\frac{3}{2} \pi \pm \varphi)$
15.	9. "	$\cot \varphi = \frac{1}{\sqrt{(\sec^2 \varphi - 2)}}$	$\cot \varphi = \frac{1}{\sqrt{(\sec^2 \varphi - 1)}}$
16.	..	$\sec \varphi = \frac{\sqrt{(1 + \cos^2 \varphi)}}{\cot \varphi}$	$\sec \varphi = \frac{\sqrt{(1 + \cot^2 \varphi)}}{\cot \varphi}$
17.	2. одозго	$\frac{\tan}{\sqrt{(1 - \tan^2)}}$	$\frac{\tan}{\sqrt{(1 + \tan^2)}}$
22.	8. одоздо	$= -\sin \alpha \sin \beta$	$= -2 \sin \alpha \sin \beta$
23.	3. "	$\tan \frac{1}{2}(\varphi - \psi)$	$\tan \frac{1}{2}(\varphi + \psi)$
25.	1. одозго	$1 - \tan^2 \alpha$	$1 - \tan^2 \alpha$
27.	7. "	$1 + \tan^2 \frac{1}{2} \beta$	$1 + \tan^2 \frac{1}{2} \beta$
"	8. одоздо	$2 \cot^2 \frac{1}{2} \beta$	$2 \cot^2 \frac{1}{2} \beta$
30.	7. одозго	сразмерносте	сразмерности
33.	11. одоздо	; дакле	. Дакле
"	8. "	$= 5,$	$= 5.$
34.	7. одозго	$\frac{1}{2} \sqrt{2}$	$\frac{1}{4} \sqrt{2}$
37.	3. одоздо	$(\sin 1' 58' - \sin 1' 57'')$	$(\sin 1' 58'' - \sin 1' 57'')$
40.	7. одозго	$\sin (60 - \beta)$	$\sin (60^0 - \beta)$
"	2. одоздо	$\sin (60^0 + \beta)$ $= \sin (60^0 - \beta)$	$\sin (60^0 + \beta)$ $= \sin (60^0 - \beta)$
43.	5. одозго	$\frac{1 + \sqrt{5}}{1}$	$\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$
"	3. "	$\frac{1}{2} \sqrt{(\frac{3}{2} + \frac{5}{4})}$	$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{2} + \sqrt{\frac{5}{4}}}$
44.	13. одозго	већъ и одавна	већъ одавна
"	1. одоздо	и а	и α
47.	3. "	упосреблююће	употреблююће
52.	8. одоздо	лучне м. у праву	праве м. у лучну
"	5. "	праве м. у лучну	лучне м. у праву
54.	4. одозго	Б.)	А.)
"	9. одоздо	страну а	страну a
56.	12. одозго	ac. B	ac. cos B
58.	3. одоздо	$(S - b)(S - b)$	$(S - a)(S - b)$



На стр.	у врсти	место	треба
60.	11.	оодоздо	$\cos B$
"	10.	"	$\cos A$
63.	3.	"	супротный A
71.	8.	"	$S - a = 52$
		$= 42 + 10$	$- 42 = 10$
"	5.	"	$\sqrt{\frac{14 \times 28}{38 \times 24}}$
79.	12.	оодозго	$\sin 81^{\circ} 55' 54''$
83.	3.	"	$c. \sin \frac{1}{2}(A+B)$
"	4.	"	$\sin \frac{1}{2}(A+C)$
87.	8.	оодоздо	за удобно
90.	8.	"	$\sin(C+a)$
"	4.	"	$(D-a)$
92.	2.	"	$(a+b) \sin \alpha$
		$\sin(\gamma-\beta)$	$\sin(\gamma-\beta)$
93.	2.	оодозго	$1-\varphi$
95.	4.	"	$\sin(w-v)$
96.	5. и 4.	оодоздо	$\sin a$
98.	10.	оодозго	$\tan \frac{1}{2}(\varphi-\psi)$
103.	11.	оодоздо	$\text{arc. } a P_2$
108.	9.	оодозго	другогъ
110.	8.	оодоздо	$A+A_1C_1$
"	5.	"	Bc
118.	2.	оодозго	§. 59.
"	"	"	§. 58.
		$-2 \tan b. \tan$	$-2 \tan b. \tan d.$
		$\cos A$	$\cos A$
119.	8.	"	$\sin \sin D$
"	9.	оодоздо	$\cos A \cos D$
121.	6.	"	$\sin \frac{A}{2}$
123.	2.	оодозго	$a \sin \varphi$
126.	1.	оодоздо	$\cos d = \cos b$
133.	4.	оодозго	$d \geq 180^{\circ} - a$
138.	1.	"	$\cos^2 \frac{1}{2}(a+b)$
"	2.	"	$\cos \frac{D}{2}$

Приметбе. 1.) У примеру §а 89. погрешанъ в логаритамъ синуса одъ $\frac{\omega}{2}$, и зато погрешанъ и савъ далый рачунъ.
 2.) Погрешке састовѣ се у променутымъ писменима, као е, л, ы... место ѣ, ль, и..., и обратно, остале су не-поправљѣне.







Ca. 17.




Ca. 19.




Ca. 25.




Ca. 23.




Ca. 27.




Ca. 20.




Ca. 24.




Ca. 21.




Ca. 28.




Ca. 22.




Ca. 29.




Ca. 30.





Ca. 26.











БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ

Р19 Ср II 475.1